

学报 4: 6. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 564, 图 2858. 1972.

矮小亚灌木, 高 10—15 厘米, 茎通常不分枝。叶为奇数羽状复叶, 被短柔毛, 小叶通常 3 枚, 有时 5 枚, 顶生小叶较大, 卵形至椭圆状卵形, 长 3—6 厘米, 宽 2.5—3.5 厘米, 先端锐尖而钝, 边缘有稀疏的粗锯齿, 基部宽楔形或圆形, 侧生小叶近圆形或卵圆形, 长 2—2.5 厘米, 宽 1—2 厘米, 有粗锯齿或有时有不规则的浅裂。聚伞花序腋生, 通常有花 3 朵, 长约 3 厘米; 萼片 5, 披针形, 外被短柔毛; 花瓣白色, 裂片 5; 雄蕊管顶端 10 裂, 花药 10。蒴果扁球形, 被细柔毛。花期 6 月, 果期 8 月。

产四川南部地区; 生阴处石缝中。模式标本采自四川金佛山。

据《四川中药志》记载, 本植物可治五癆咳嗽、跌打损伤及风湿病; 也可外敷无名肿毒。

5. 小芙蓉 (植物分类学报)

Munronia heterotricha H. S. Lo in Acta Phytotax. Sin. 15 (1): 68. 1977; 广东植物志 2: 284. 1991.

矮小半灌木, 高达 10 厘米; 茎通常不分枝, 密被黄褐色柔毛。叶聚集于茎的上部, 奇数羽状复叶; 小叶通常 3 片, 很少 5 片, 厚纸质, 顶生小叶有柄, 较大, 长圆形或长圆状卵形, 长 3—4 厘米, 宽 1.5—2 厘米, 顶端圆或钝, 基部楔形或圆形, 边缘有粗大的重锯齿或羽状浅裂, 叶面被糙伏毛, 背面被柔毛, 但中脉和侧脉上被硬毛, 侧脉每边约 5 条, 微凸起; 侧生小叶小, 近无柄, 近圆形, 长 5—7 毫米。花单生叶腋, 花梗长约 5 毫米, 和花冠均被硬毛; 雄蕊 10, 雄蕊管顶端有 10 个线形裂片。蒴果扁球形, 宽约 7 毫米, 被硬毛, 果柄近直立, 长约 6 毫米; 种子球状, 黄褐色。花期 4 月, 果期 10 月。

产广东; 生荒坡草地上。模式标本采自广东海康。

6. 云南地黄连 (新拟) 小地黄连 (云南植物志) 图版 13: 3—6

Munronia delavayi Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. 33: 451. 1886; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 6. 1955; 中国高等植物图鉴 2: 565. 1972; 云南植物志 1: 216, 图版 50: 3—6. 1977; 云南种子植物名录, 上册 832. 1984.

矮小亚灌木, 植株高 2.5—15 厘米, 被柔毛。叶为奇数羽状复叶, 小叶通常 7—9 枚, 有时 5 枚; 小叶近无柄, 倒卵形至近圆形, 侧生小叶长 1—3 厘米, 宽 0.8—2 厘米, 几无柄, 顶生小叶长 2—3.5 (—5) 厘米, 宽 1.3—1.8 (—2.8) 厘米, 柄长 2—3 毫米或更长 (6—8 毫米), 顶端钝或短渐尖, 基部楔形或宽楔形, 两面均被稀疏紧贴的柔毛, 脉上尤密, 边缘中部以上深齿状或近羽状分裂, 每边通常有粗齿 1—3 枚, 有时 5 枚, 下部全缘; 叶柄长 1.5—3 厘米。花序腋生, 有花 1 朵或 2—5 朵; 花具短柄, 有小苞片; 萼 5 裂达基部, 裂片小, 线状披针形, 外被微柔毛, 长约 2.5 毫米; 花冠白色, 无毛, 花冠管长 2.2 厘米, 裂片近相等, 长椭圆形或倒卵形, 长 10—12 毫米; 雄蕊管长 3 厘米, 下部与花冠管合生, 无毛, 具裂齿; 子房被毛, 花柱线形, 与雄蕊管等长, 无毛, 柱头头