

上部被毛，花柱圆柱形，柱头盘状，顶端不开裂。浆果球形或卵形，直径1—2厘米，密被黄褐色柔毛，有种子1—2颗。花期2—3月，果期4—6月。

产广东、云南等省；生于山地密林或疏林中。分布于印度、中南半岛、马来半岛、印度尼西亚等。

2. 云南割舌树 (云南植物志)

Walsura yunnanensis C. Y. Wu, Fl. Yunnan. 1: 226, pl. 53: 9—12. 1977; 云南种子植物名录, 上册 835. 1984. — *W. tubulata* auct. non Hiern; Harms in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, 19b (1): 119. 1940.

乔木，高4—6米；小枝幼嫩被短柔毛，后变无毛，具苍白色皮孔。叶长23—30厘米，叶柄长4—7（—9）厘米，上面扁平，背面圆形，两侧具不明显的狭翅，无毛；小叶5，坚纸质或革质，椭圆形或卵状长圆形，侧生小叶长（10—）14—18厘米，宽（3—）5—7厘米，顶生小叶更大，先端渐尖至急尖，基部渐狭至阔楔形，两面无毛，叶面绿色，光亮，背面粉绿色，侧脉8—11对，在背面明显凸起；小叶柄长0.5—1厘米，顶生的长2—3厘米。圆锥花序腋生和顶生，长6—14厘米，短于叶，被黄色短柔毛。花长4—5毫米；花梗约与花等长，被短柔毛；花萼5裂，裂齿三角形，外被短柔毛；花瓣5，白色，长圆形，长5毫米，急尖，外被粉状柔毛，内面无毛；雄蕊10，长2—3毫米，花丝基部1/2以上合生，上部分离，扁平，顶端钻形，中部以上两面被长柔毛，花药卵形，无毛；花盘环状，肉质，无毛；子房扁平，密被黄白色短柔毛，柱头盘状。果未见。花期2—3月。

产云南的西双版纳；生海拔950—1000米左右的山谷或斜坡疏林中。模式标本采自云南勐腊。

3. 越南割舌树 (植物分类学报) 图版 15: 6—8

Walsura cochinchinensis (Baill.) Harms in Engl. u Prantl. Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 302. 1897, et ed. 2, 19b (1): 119. 1940; Pierre, Fl. Forest. Cochinch. 4: t. 354B. 1897; Pellegr. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1: 786, fig. 84: 1—4. 1911; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 14: 18. 1935; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 35. 1955; 海南植物志 3: 72. 1974; 广东植物志 2: 300. 1991. — *Heynea cochinchinensis* Baill. in Adansonia 11: 265. 1873—1876.

灌木至小乔木，高1—4米，有时可达8米；茎粗壮，分枝；树皮灰褐色，有苍白色皮孔。叶长15—20厘米；叶柄长1—4厘米，具棱；小叶1—3枚，对生，薄革质，卵形至卵状披针形，顶生小叶长8—12厘米，宽3—5.5厘米，侧生者较小，先端渐尖，基部楔形，两面无毛，叶面绿色，有光泽，背面粉绿色，侧脉8—10对，于边缘处弯拱而连接，背面凸起，小脉网状，不规则，两面略凸起；小叶柄长0.5—1.5厘米，顶生者较长，2.5—3.5厘米，具节。圆锥花序极短，长1—6厘米，被柔毛；花长4—5毫米；花梗纤

细，略短于花；花萼5齿裂，裂片三角形，顶端急尖，外面被微柔毛；花瓣5，白色，狭长圆形，长约5毫米，先端略尖，背面被微柔毛；雄蕊10，花丝阔，顶端2齿裂，中部以下连合成管，稍被微柔毛，花药卵形，顶端尖，着生于顶端的裂齿间；花盘杯状，红色，无毛，子房2室，球形，压扁，被粗毛，花柱圆柱形，柱头盘状，顶端2齿裂。浆果球形或卵形，直径1.5厘米，密被黄褐色柔毛，外果皮薄，内果皮硬革质，有种子1—2颗。花期4—7月，果期6—12月。

产广东、海南、广西等省区的南部；生山地密林或疏林中。分布于越南。

10. 鹧鸪花属 *Trichilia* P. Br.

P. Br. Hist. Jamaic. 278. 1756. — *Heynea* Roxb. Hort. Beng.

33. 1814, nom. nud., et in Curtis's Bot. Mag. 41: sub. tab. 1738.

1815.

乔木或灌木；枝无毛或有的嫩枝被黄色短柔毛，老时无毛。叶互生，奇数羽状复叶；小叶对生，全缘，无小斑点。花小，两性，组成聚伞花序，再由多个聚伞花序组成腋生或顶生、具长梗的圆锥花序；花萼短，4—5裂，裂片覆瓦状排列；花瓣4—5，远较花萼为长，长椭圆形，彼此分离，花芽时覆瓦状排列；雄蕊管8—10深裂，裂片线形，顶端2齿裂，花药8—10，着生2齿裂间；花盘环状，肉质；子房无毛或被绒毛，2—3室，每室有并生的胚珠2颗，花柱与子房等长或略长，柱头盘状或圆锥状，顶端2—3裂。果为蒴果，无毛或被短柔毛，1室，2瓣裂，有种子1枚或2枚；种子无翅，有假种皮，无胚乳，假种皮薄，白色，子叶厚，半球形。


约86种，分布于美洲和非洲的热带地区和亚洲的印度、中南半岛和马来半岛。我国产2种1变种，分布于广东、广西、海南、四川、贵州和云南等省区。

属模式种：毛鹧鸪花 *Trichilia hirta* Linn.

分种检索表

1. 子房和蒴果无毛，具种子1粒；小叶片两面无毛或有时仅背面被黄色微柔毛 1. 鹧鸪花 *T. connaroides* (Wight et Arn.) Benth.
1. 子房和蒴果被黄色柔毛，通常有种子1粒，偶2粒；小叶叶面无毛或仅沿中脉被微柔毛，背面被黄色长柔毛，脉上尤密 2. 茸果鹧鸪花 *T. sinensis* Benth.
1. 鹧鸪花 (中国种子植物科属词典)

Trichilia connaroides (Wight et Arn.) Benth. in Acta Bot. Neerl. 11: 13. 1962; 云南植物志 1: 222, 图版 53: 1—4. 1977; 云南种子植物名录, 上册 834. 1984. —



图版 15 1—5. 割舌树 *Walsura robusta* Roxb.: 1. 花枝, 2. 果序, 3. 雄蕊管展示, 4. 雄蕊上部分离部分; 5. 雌蕊。6—8. 越南割舌树 *W. cochinchinensis* (Baill.) Harms: 6. 花枝, 7. 雄蕊管展示, 8. 雄蕊上部分离部分。(余汉平绘)