

in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1: 760. 1911; Merr. in Lingn. Sc. Journ. 5: 104. 1927; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 20. 1955; 海南植物志 3: 66. 1974, non Hiern in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 555. 1875, nec C. DC. Monogr. Phan. 1: 604. 1878; 广东植物志 2: 290. 1991.

乔木, 高 4—15 米; 幼枝被锈色、鳞片状星状毛。叶互生, 叶柄和叶轴幼时被锈色鳞片状柔毛, 后变无毛; 小叶 5—9, 对生或近对生, 薄纸质, 椭圆形至长椭圆形, 长 8—12 厘米, 宽 2.5—4.5 厘米, 先端渐尖而钝, 基部楔形或宽楔形, 稍偏斜, 两面均无毛, 叶面有光泽, 背面干时苍黄色, 侧脉 9—13 对, 纤细, 背面稍凸起, 全缘; 小叶柄长 5—8 毫米。圆锥花序腋生, 约与叶等长或略短, 疏散, 被锈色或淡黄色鳞片状星状毛, 由基部 1—3 厘米处分枝; 花梗约与花等长, 与花萼同被锈色鳞片状星状毛; 花萼长约 0.6 毫米, 5 裂, 裂片圆形; 花瓣 5, 长圆形, 长 1—1.5 毫米, 无毛, 先端圆形; 雄蕊管近球形, 稍短于花瓣, 顶端全缘或呈浅波状, 花药 5, 内藏; 花盘缺; 子房密被鳞片状星状毛。浆果近球形或梨形, 直径 1.5—2.5 厘米, 密被黄褐色短绒毛, 花期 6—10 月, 果期 7—翌年 4 月。

产广东、海南、广西等省区; 多见于山地湿润山谷密林中。分布于中南半岛、马来半岛。

木材赤色, 坚硬, 纹理密致美丽, 比重 0.98, 可作车辆、船板、农具、建筑、家具等用材。

3. 碧绿米仔兰 (植物分类学报) 图版 17: 9—12

Aglaia perviridis Hiern in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 556. 1875; C. DC. Monogr. Phan. 1: 610. 1878; Harms in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 300. 1897; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 304. 1944; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 4: 21. 1955; 云南植物志 1: 239, 图版 57: 5—8. 1977; 云南种子植物名录, 上册 827. 1984.

乔木, 高可达 15 米; 小枝暗灰色, 散生有苍黄色的小皮孔。叶长约 30 厘米, 有小叶 9—13 枚; 厚纸质或亚革质, 互生或近对生, 长椭圆形或卵状长椭圆形, 长 5—15 (—18) 厘米, 宽 (2—) 3—4.5 厘米, 先端渐尖, 基部楔形或近圆形, 稍不等边, 两面均无毛, 侧脉每边 12—16 条, 纤细, 小叶柄长 5—10 毫米。圆锥花序腋生, 稍短于叶, 长 20—24 厘米, 有暗灰色的鳞片, 下部分枝长约 9 厘米; 花极小, 直径约 2 毫米, 无毛, 具短梗; 花萼 5 深裂, 裂片圆形, 有小睫毛; 花瓣 5, 白色, 圆形至卵形, 长约 1.5 毫米; 雄蕊管近球形, 无毛; 花药 5, 卵形; 子房每室有胚珠 2 颗。浆果长圆形、肾状, 长 3—3.8 厘米, 宽约 2 厘米, 外被锈色鳞片; 种子 1 枚, 具污黄色、肉质假种皮。花期 3—5 月, 果期 9—12 月。

产云南南部及东南部; 生于沟谷雨林、季雨林及常绿阔叶林中。分布于印度、锡金。

4. 缩序米仔兰 (云南植物志)



图版 17 1—5. 米仔兰 *Aglaia odorata* Lour. var. *odorata*: 1. 花枝, 2. 花, 3. 雄蕊管, 4. 雄蕊管纵剖面, 5. 果。6—8. 山柰 *A. roxburghiana* Miq.: 6. 果枝, 7. 花, 8. 果。9—12. 碧绿米仔兰 *A. perviridis* Hiern: 9. 果枝, 10. 花, 11. 雄蕊管部分展开, 示子房和柱头, 12. 果。(邓盈丰绘)