

## 亚族 4. 溪桫亚族 Subtrib. 4. CHISOCHETONINAE Harms

Harms in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2. **19b** (1): 40. 1940.

乔木。叶互生，大型羽状复叶，小叶对生或近对生。雄蕊花丝连合成圆柱状，花药 4—5 枚；花盘环状、浅杯状或缺；子房 2—4 室，每室有胚珠 1 颗。果为蒴果。

全世界产 4 属；我国产 1 属。

### 16. 溪桫属 *Chisocheton* Bl.

Bl. Bijdr. 168. 1825

乔木。叶互生，为大型羽状复叶；小叶对生或近对生，全缘。花两性或杂性异株，狭而延长，4—5 基数，组成腋生的圆锥花序或近穗状花序；萼杯状或管状，全缘或稍具齿裂；花瓣 4—5，线状长椭圆形，分离，芽时近镊合状排列；雄蕊的花丝合生成一长圆柱状的管，稍短于花瓣，狭裂或近全缘，顶部里面具药，花药长圆形，与管的裂片互生；花盘环状或浅杯状或缺，将子房环绕；子房 2—4 室，外面被粗毛，每室有 1 颗胚珠，花柱线状，远较子房为长，柱头头状。果为蒴果，革质，2—4 室，室裂 2—4 个不规则的果瓣；种子厚，盾状。

约 50 种，分布于印度、中南半岛至马来半岛。我国产 1 种，分布于广西、云南等省区。

属模式种：*Chisocheton divergens* Bl.

1. 溪桫 (植物分类学报) 图版 18: 1—5

*Chisocheton paniculatus* (Roxb.) Hiern in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 552. 1875; C. DC. Monogr. Phan. **1**: 531. 1878; Pellegr. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **1**: 736. 1911; Chen in Sunyatsenia **4**: 237. 1940; Harms in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2. **19b** (1): 151. 1940; 侯宽昭、陈德昭, 植物分类学报 **4**: 18. 1955. — *Guarea paniculata* Roxb. Hort. Beng. 28. 1814, nom. nud. et Fl. Ind. et 2, **2**: 242. 1832. — *Chisocheton chinensis* Merr. in Philip. Journ. Sc. Bot. **21**: 497. 1922; 云南植物志 **1**: 242. 1977; 云南种子植物名录, 上册 829. 1984. — *C. siamensis* auct. non Craib; 云南植物志 **1**: 242, 图版 57: 1—4. 1977; 云南种子植物名录, 上册 829. 1984.

乔木，高 16 米；幼枝和花序被黄褐色粗硬毛。叶长 30—100 厘米或更长，通常具小叶 10—12 对，叶轴和叶柄被紧贴粗毛；小叶片纸质至薄革质，长圆形至长圆状披针形，长 13—30 厘米，宽 4—6 厘米，先端渐尖，基部楔形、宽楔形或圆形，稍偏斜，无毛或