

叶片椭圆形，长12.5—17厘米，宽4—7厘米

..... 3. 云南风筝果 *H. yunnanensis* Huang ex S. K. Chen

5. 翅果仅果核被短绢毛，翅无毛；叶长圆形，椭圆状长圆形或卵状披针形，长9—18厘米，宽3—7厘米，幼时被短柔毛，老时变无毛 4. 风筝果 *H. benghalensis* (L.) Kurz

3. 花萼之腺体近圆形或长圆形，不下延至花梗上。

6. 叶片长圆形，长12—13厘米，宽5—5.5厘米，先端急尖，基部心形，翅果之中翅长倒卵形，长2.2—2.5厘米 5. 多花风筝果 *H. multiflora* F. N. Wei

6. 叶片椭圆形或卵状椭圆形或卵形，先端渐尖，基部楔形或圆形；翅果之中翅长圆形。

7. 总状花序顶生，长达11厘米；萼片长圆形；叶片椭圆形或卵状椭圆形，先端长渐尖，基部楔形 6. 白蜡叶风筝果 *H. fraxinifolia* F. N. Wei

7. 总状花序腋生，长2—3厘米；萼片卵圆形；叶片卵形或椭圆形，先端渐尖，基部圆形或阔楔形 7. 田阳风筝果 *H. tianyangensis* F. N. Wei

2. 花萼有2枚萼片具腺体 8. 罗甸风筝果 *H. luodianensis* S. K. Chen

1. 花萼不具腺体。

8. 花序轴及花梗密被黄褐色紧贴柔毛；叶片卵形、卵状披针形或椭圆形，长4—8厘米，宽2.5—3.5厘米，先端渐尖，基部楔形 9. 小花风筝果 *H. minor* Dunn

8. 花序轴及花梗被白色短绒毛；叶片披针形或倒卵状披针形，先端渐尖状钝圆或近圆形，基部渐狭至叶柄 10. 披针叶风筝果 *H. lanceolata* J. Ar.

1. 白花风筝果 (云南种子植物名录)

Hiptage candicans Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 419. 1874; P. Dop in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1: 597. 1911; Nied. in Engl. Pflanzenr. 91 (IV.-141): 82. 1928; J. Arènes in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, suppl. 1: 511. 1945; 云南种子植物名录，上册 428. 1984. — *H. arborea* Kurz in Journ. Asiat. Soc. Bengl Part 2, 42: 228. 1873.

1a. 白花风筝果 (原变种) 图版 25: 1—4

var. *candicans*

直立灌木或小乔木；幼枝，叶柄和叶两面均密被淡黄色或灰白色绒毛。叶对生，长圆形或椭圆状长圆形，长9—15厘米，宽4—8厘米，先端短渐尖，基部阔楔形或圆形，全缘，老时叶面变无毛或仅脉上被疏柔毛，背面密被灰白色绒毛；叶柄长5—10毫米。总状花序腋生，花序轴、花梗、苞片和萼片均密被黄褐色柔毛；花梗长1.5—2厘米，中部以下具关节；苞片披针形，腺体1，黑褐色，长圆状披针形，长3—4毫米；萼片5，长4—5毫米，先端三角形；花瓣白色，卵形或近圆形，长8—11毫米，宽6—8毫米，外面密被白色丝毛；雄蕊不等长，花丝多数长3—5毫米，1枚长8—10毫米，花药长1.5—2毫米；花柱细，长约12毫米，顶端尖。翅果被黄褐色短柔毛，中间的翅椭圆状披针形，长3—3.5厘米，顶端圆形或有数浅裂，侧翅长1—1.5厘米，顶端圆形或具数浅裂。