

花期 2—3 月，果期 4—5 月。

产云南南部和西南部；生于海拔 570—1 300 米的山坡灌丛中或疏林中。分布于印度、缅甸和泰国。

1b. 越南白花风筝果（变种）（云南种子植物名录） 图版 25：5—8

var. *harmandiana* (Pierre) P. Dop in Bull. Soc. Bot. France **55**: 429. 1908, et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, 1: 598. 1911; J. Arenes in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, suppl. 1: 513. 1945; 云南种子植物名录, 上册 428. 1984. ——*H. harmandiana* Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17. t. 272 A. 1892.

本变种与白花风车藤（原变种）之主要区在于：本种为木质藤本，幼枝无毛或仅疏被柔毛，叶片两面无毛，光亮，基部背面两侧各具 2 腺体；花梗中部以下具关节；花瓣粉红色；雄蕊之花丝多数长 4—6 毫米，最长之 1 枚达 15 毫米；花柱长达 16 毫米。

产云南南部；生于山地林中。分布于老挝。

2. 尖叶风筝果（云南种子植物名录）

Hiptage acuminata Wall. ex A. Juss., Cat. 1065. 1828, nom. nud.; Juss. in Ann. Sc. Nat. 2. Ser. Bot. **13**: 269. 1840, et in Arch. Mus. **3**: 503. 1843; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 419. 1874; Nied. in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg **6**: 43. 1915, et in Verz. Vorles. Ak. Braunsberg S.-S. **1924**: 14. 1924, et in Engl. Pflanzenr. **91** (IV-141): 80. 1928; 云南种子植物名录 **1**: 428. 1984.

攀援灌木；幼枝圆形，密被淡黄褐色紧贴短柔毛，二年生以上枝条暗褐色，无毛，具淡色皮孔。叶片革质，披针形、长圆形或卵形，长 7.5—12 厘米，宽 3—4.5 厘米，先端长渐尖，基部阔楔形至近圆形，背面具 2 腺体，全缘，稍外卷，两面无毛，主脉上面平坦，背面隆起，侧脉 5—6 对，两面突起，网脉上面突起，背面平坦，几不明显；叶柄粗，上面具槽，长约 6 毫米，近无毛或幼时被紧贴短柔毛。托叶卵形，小、早落。总状花序腋生或顶生，长 4—6 厘米，密被紧贴短柔毛，具 4—10 花，密集；花梗长 10—15 毫米，密被紧贴短柔毛，中部以上具关节，小苞片钻状披针形，密被紧贴柔毛，位于关节以下；花芽近球形，径约 7 毫米。花径约 1.5—2.0 厘米；萼片 5，椭圆形，长约 4—5 毫米，宽约 3 毫米，外面密被短柔毛，先端圆形，腺体 1，卵状长圆形，约 3—4 毫米，约 1/4 下延至花梗上；花瓣白色带粉红，近圆形，长 10—11 毫米，宽约 9 毫米，先端圆形，基部具爪，内凹，外面被短柔毛，边缘具极短的裂齿状流苏；雄蕊 10，不等大，最大者长约 10 毫米，余 5—7 毫米，花药卵形；子房具翅，被短柔毛，花柱长约 1.2 厘米，拳卷状。翅果之坚果密被紧贴短柔毛，中翅倒卵状长圆形，长约 2.5—3 厘米，宽约 12 毫米，先端圆形，微缺，侧翅线状披针形，长约 13 毫米，宽约 5—6 毫米，均疏被紧贴短柔毛。

花期 3—4 月，果期 4—5 月。

产云南保山和景东；生于海拔 1 400 米的山谷林缘。分布于孟加拉、印度和缅甸。