

边、田边的灌丛中。分布于越南北方和老挝。

5. 多花风筝果 (新拟) 多花风车藤 (植物分类学报)

*Hiptage multiflora* F. N. Wei in Acta Phytotax. Sin. 19 (3): 356, fig. 3. 1981.

藤状灌木, 高约 2 米; 枝条圆柱状, 有圆形皮孔, 稍粗糙, 近无毛。叶革质, 长圆形, 长 12—13 厘米, 宽 5—5.5 厘米, 顶端急尖, 基部心形, 有 2 枚腺体, 上面无毛, 下面无毛或仅沿中脉和细脉上被柔毛, 边缘干后反卷, 中脉粗壮, 并在两面明显突起, 侧脉每边 6—7 条。总状花序多花, 腋生, 密被微柔毛; 花梗长 1 厘米, 中间具关节; 萼片 5, 卵圆形, 被微柔毛, 基部具腺体 1 枚。翅果被微柔毛, 翅不对称, 顶端全缘或具不整齐的锯齿, 中间的翅长倒卵形, 长 2.2—2.5 厘米, 侧翅较小, 长圆形, 长 1.7 厘米, 宽 5 毫米。

产广西南部; 生于石山山顶向阳灌丛中, 海拔 600 米。模式标本采自广西龙州。

6. 白蜡叶风筝果 (新拟) 白蜡叶风车藤 (植物分类学报)

*Hiptage fraxinifolia* F. N. Wei in Acta Phytotax. Sin 19 (3): 356, fig. 2. 1981.

藤状灌木; 嫩枝密被短柔毛, 老枝呈棕褐色, 有圆形的皮孔。叶片椭圆形或卵状椭圆形, 长 11—13 厘米, 宽 3—5.5 厘米, 先端长渐尖, 基部楔形, 除下面中脉外其余无毛, 中脉两面突起, 侧脉每边 6—9 条; 叶柄长 5—6 毫米, 被微柔毛。总状花序顶生, 长 11 厘米, 被微柔毛; 萼片 5, 长圆形, 外被微柔毛, 有长圆形腺体 1 枚。翅果疏被微柔毛, 翅长圆形, 被疏柔毛, 顶端钝, 全缘或具不整齐的锯齿, 中间的翅长约 4 厘米, 宽约 8 毫米, 两侧的翅长 2.8 厘米, 宽约 1 厘米。果期 5—6 月。

产广西南部; 生于海拔 400 米的土山山谷荫处密林中。模式标本采自广西横县。

7. 田阳风筝果 (新拟) 田阳风车藤 (植物分类学报)

*Hiptage tianyangensis* F. N. Wei in Acta Phytotax. Sin. 19 (3): 358, fig. 4. 1981.

贵州植物志 8: 100. 1988.

藤状灌木; 枝条圆柱形, 栗色, 有许多皮孔; 小枝灰褐色, 被微柔毛。叶对生, 卵形或椭圆形, 长 7—12 厘米, 宽 2.5—5.5 厘米, 先端渐尖, 基部阔楔形或圆形, 边缘外卷, 两面无毛, 中脉和侧脉两面均明显凸起, 侧脉每边约 6 条; 叶柄长约 5 毫米。总状花序腋生, 较短, 长约 2—3 厘米, 花梗被短柔毛; 萼片 5, 卵圆形, 长 3 毫米, 顶端钝, 除边缘外, 外面无毛, 具 1 枚腺体; 花瓣 5, 白色, 卵状圆形, 外被短柔毛, 不对称, 边缘流苏状; 花丝无毛; 子房 3 深裂, 被微柔毛, 花柱无毛。翅果被微柔毛, 翅近长圆形, 顶端不整齐或具锯齿, 中间翅长约 2.5 厘米, 宽约 6 毫米。花期 3 月, 果期 4—5 月。

产广西西部与贵州南部; 生于海拔 200—350 米的丘陵地区向阳山坡或山顶灌丛中。模式标本采自广西田阳。

8. 罗甸风筝果 (云南植物研究)

*Hiptage luodianensis* S. K. Chen in Acta Bot. Yunnan. 18 (4): 409, 图 3. 1996.