

灌木，直立或攀援；幼枝密被淡黄褐色紧贴短柔毛，二年生以上枝条圆柱形，暗紫褐色，无毛，粗糙，密具近圆形皮孔。叶片纸质，披针形或狭卵状披针形，长4—4.5厘米，宽1.5—2厘米，先端长渐尖，基部阔楔形至近圆形，背面无腺体，叶面绿色，无毛，背面淡绿色，除主脉基部疏被紧贴柔毛外无毛，侧脉5—6对；叶柄长约4毫米，被紧贴短柔毛。总状花序单生于去年生枝条的叶痕腋内，长3—3.5厘米，具6—14花，密被淡黄褐色紧贴短柔毛，基部具2—3枚卵状披针形苞片，苞片密被短柔毛；花梗长约1厘米，密被紧贴短柔毛，上部1/3处具关节，中部具2枚互生的线状披针形小苞片；花芽近球形，径约4毫米；花直径约1.5厘米；萼片5，椭圆形，长约3毫米，宽约1.5毫米，先端圆形，外面被短柔毛，具缘毛，内面无毛，其中2枚的下部边缘各具1椭圆形腺体，长约0.5毫米；花瓣白色带紫，近圆形，径约8毫米，边缘具流苏，外面中部被短柔毛，基部圆形，具爪；雄蕊10，不等大，最大的1枚长约8毫米，弯弓形，其余长约4毫米，花药长圆形，纵裂；子房被短柔毛，具翅，花柱长约8毫米，弯拱。幼果及翅密被短柔毛。花期3—4月。

产贵州南部（罗甸）；生于海拔500米的山坡疏林中。模式标本采自罗甸。

本种与田阳风箏果 *H. tianyangensis* F. N. Wei 相似，但本种之叶披针形或卵状披针形，小，长4—4.5厘米，宽1.5—2厘米，纸质，萼片椭圆形，外面密被短柔毛，其中2枚的下部边缘具腺体；而后的叶片革质，卵形或椭圆形，大，长7—12厘米，宽2.5—5.5厘米，萼片除边缘外无毛，两萼片间具1长1毫米的腺体，易于区别。


9. 小花风箏果（云南种子植物名录） 图版26：7—11

Hiptage minor Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. **35**: 487. 1903; Nied. in Engl. Pflanzenr. **91** (IV-141): 83. 1928; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 622. 1933; 云南种子植物名录，上册428. 1984. — *H. henryana* Nied. in Arb. Bot. Inst. Ak. Braunschweig **6**: 45. 1915, et in Verz. Vorles AK. Braunschweig s.-s. **1924**: 14. 1924.

直立灌木，稀藤状灌木，高60—90厘米；茎皮纵裂，幼枝被微柔毛，后变无毛。叶对生，革质，卵形或卵状披针形，长4—8厘米，宽2.5—3.5厘米，先端渐尖，基部楔形，两面无毛，叶脉两面稍突起；叶柄长3—6毫米。总状花序腋生或顶生，比叶短，花序轴及花梗被紧贴黄褐色柔毛；花芳香，花梗中部具关节，有苞片2，早落；萼片三角形或近圆形，长2毫米，外面被紧贴黄褐色柔毛；花瓣白色，近圆形，长7—8毫米，边缘具流苏；雄蕊明显比花瓣短；子房被短柔毛。翅果无毛或被微柔毛，中间翅长圆状椭圆形，长2.5—3厘米，顶端通常2—3浅裂或圆形，侧翅长1.2—1.5厘米，顶端圆形或有齿裂。花期3—4月，果期4—5月。

产贵州、云南；生于山坡疏林中或灌丛中，海拔200—1400米。模式标本采自云南蒙自。

10. 披针叶风箏果（新拟）



图版 26 1—6. 风筝果 *Hiptage benghalensis* (Linn.) Kurz var. *benghalensis*: 1. 花枝, 2. 花, 3. 花瓣, 4. 花去花瓣, 示花萼与腺体, 5. 花去花被, 示雄蕊与雌蕊, 6. 翅果。7—11. 小花风筝果 *H. minor* Dunn: 7. 花枝, 8. 花, 9. 花瓣, 10. 花去花瓣, 示花萼, 11. 花去花被, 示雄蕊与雌蕊, 12. 果。(黄少容绘)