

91 (IV-141); 283. 1928; Jacobs in Fl. Mal. ser. 1. 5: part. 2. 139. 1956; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 401. 1963, et Fl. Taiwan 3: 554. 1977. — *Banisteria timoriensis* DC. Prodr. 1: 588. 1824. — *Rhysopterys dealbata* A. Juss. in Arch. Mus. Hist. Nat. Paris 3: 386. 1843; Kanehira, Form. Trees Rev. ed. 328. 1936.

木质藤本，长可达 10 米；嫩枝密被短柔毛，后渐变无毛。叶对生，卵形或阔卵形，通常长 8—12 厘米，宽 4—7 厘米，先端急尖，基部稍带心形、圆形或截平，在基部与叶柄交界处有二个圆形的黑褐色腺体，全缘，叶面无毛，背面无毛或有微柔毛，侧脉每边 4—7 条；叶柄纤细，长 1—7 厘米，被黄褐色或灰白色微柔毛。花序腋生，总花梗和花梗被紧贴的灰白色短柔毛，苞片卵圆形，顶端急尖，长约 3 毫米，外被黄褐色微柔毛；花香，花梗中间具关节，小苞片卵圆形，长约 1.5 毫米，外被黄褐色微柔毛；萼片圆形，长约 2 毫米，外被微柔毛；花瓣黄色，圆形或椭圆形，多少具爪，长 6—10 毫米，全缘；雄蕊长 2—4 毫米，花丝丝状；花柱 3，细长，柱头头状。翅果长 2—4 厘米，宽 1—1.5 厘米。花期 7 月。

产台湾；生于海岸地区。分布于马来西亚、印度尼西亚、密克罗尼西亚和澳大利亚。

### 族 3. 金虎尾族 Trib. 3. MALPIGHIEAE

Benth. et Hook. f.

Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 248. 1862; Hutch. Gen. Flow. Pl.

2: 572. 1967.

直立灌木或小乔木。花两性，5 基数，花托扁平或微凹；雄蕊 10，全部发育。果为核果或朔果。

约 19 属，全产美洲热带地区；我国引入栽培有 2 属 2 种。

#### 5. 金虎尾属 *Malpighia* Plum. ex Linn.

Plum. ex Linn. Syst. ed. 1. 1735; Linn. Sp. Pl. 425. 1753.

灌木或小乔木。叶对生，全缘或具齿缺，无毛或被毛，具短柄；托叶细小。花两性，左右对称，排列成紧密的聚伞花序或有时单花腋生；花萼 5 深裂，有大而无柄腺体 6—10 枚；花瓣 5，不等大，覆瓦状排列，全缘，无毛，具长柄；雄蕊 10，全部发育，无毛，比花瓣短，花丝基部合生；子房无毛，花柱 3，分离，其中仅 2 枚真正发育，1 枚败育。果为核果，核背有翅 3—5 条。

约 30 种，主产热带美洲。我国广州和海南引种 1 种。

属模式种： *Malpighia glabra* Linn.