

色，两面无毛，主脉在叶面具槽，背面隆起，侧脉9—12对，上举，于边缘网结，背面隆起，细脉网状；叶柄长约1厘米，上面具槽，被短柔毛。总状花序顶生或腋生，无毛，果时长13—14厘米，下垂。花不详。蒴果双生，紫红色，肾形，长约9毫米，宽约11毫米，具阔翅，先端微凹，基部具盘状环，果片具纵条纹，有种子2粒，仅1枚发育成熟；种子圆形，黑色，无毛，具盔状种阜。果期3月。

产云南南部（勐海，模式产地）；生于山坡疏林中或路旁灌丛中。

本种与黄花倒水莲 *P. fallax* Hemsl. 相似，唯本种枝、叶和花序无毛；蒴果双生，具阔翅，种子仅1枚成熟，无毛，易于区别。

3. 荷包山桂花（植物名实图考）

Polygala arillata Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nep. 199. 1825; Wall. in Pl. As. Rar. 1: t. 100. 1831; Wight in Icon. 3: t. 936. 1843—50; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. ser. 2, 8: 203 (Pl. David. 2: 21) 1886, et Pl. Delavay. 77. 1889; Chodat in Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève 31 (2): 94, t. 17. fig. 12—14. 1893, et in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3: (4): 333. 1897; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 29: 426. 1900; Rehd. et Wils. in Sargent, Pl. Wilson. 2: 160. 1914; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 633. 1933; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine, Suppl. 1: 231. 1939; 中国高等植物图鉴 2: 577, 图 2883. 1972; Hara in Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nep. 2: 50. 1979; 云南植物志 3: 273. 1983; 云南种子植物名录, 上册 209. 1984; Banerjee et al. in Bull. Bot. Surv. India 26: (1—2): 3. 1984; 西藏植物志 3: 50, 图版 16: 1—3. 1986; 陈书坤, 植物分类学报 29 (3): 204. 1991. — *Chamaebuxus arillata* Hassk. in Ann. Mus. Lung.-Bat. 1: 153. 1863—1864. — *C. arillata* Hassk. var. *brachybotrya* Hassk. et var. *robusta* Hassk. l. c. 154. — *Polygala wistatiiifolia* Chodat in Engl. Bot. Jahrb. 52: Beil. 115: 70. 1914. — *Cratalearia duboisii* Lévl. Cat. Pl. Yunnan. 1916.

3a. 荷包山桂花（原变种） 黄花远志（中国高等植物图鉴），白糯米（云南），小鸡花（云南禄劝），鸡肚子根（云南景东），阳雀花（四川）

var. *arillata*

灌木或小乔木，高1—5米；小枝密被短柔毛，具纵棱；芽密被黄褐色毡毛。单叶互生，叶片纸质，椭圆形、长圆状椭圆形至长圆状披针形，长6.5—14厘米，宽2—2.5厘米，先端渐尖，基部楔形或钝圆，全缘，具缘毛，叶面绿色，背面淡绿色，两面均疏被短柔毛，沿脉较密，后渐无毛，主脉上面微凹，背面隆起，侧脉5—6对，于边缘附近网结，细脉网状，明显；叶柄长约1厘米，被短柔毛。总状花序与叶对生，下垂，密被短柔毛，长7—10厘米，果时长达25（—30）厘米；花长13—20毫米，花梗长约3毫米，被短柔毛，基部具三角状渐尖的苞片1枚；萼片5，具缘毛，花后脱落，外面3枚小，不