

以下合生，先端圆形，龙骨瓣具2深裂片状的鸡冠状附属物；雄蕊8，花丝长约7毫米，5/7以下合生成鞘，分离部分丝状，花药卵形；子房圆形，径约1毫米，具翅，无毛，基部具花盘，花柱长7毫米，由下向上逐渐增粗，并弯曲，顶端喇叭状2浅裂，柱头生于上裂片内。蒴果圆形，径约3毫米，淡绿色，边缘带紫色，具翅，顶端具缺刻，基部具花盘及花被脱落后的环状疤痕。种子不详。花期4—9月，果期6—10月。

产湖南、广东和广西；生于阔叶林中岩石上，海拔700—930米。模式标本采自广东曲江。

本种之全草入药，民间用于治疗咳嗽、咽喉肿痛、小儿疳积、月经不调。

本种与大叶金牛 *P. latouchei* Franch. 相似，两者均为矮小亚灌木，紫红色花，唯后者之叶片纸质，卵状至倒卵状披针形或椭圆状披针形，较大，3.5—8厘米×1.5—2.2（—2.5）厘米，叶基近圆形，偏斜不等侧；苞片卵状披针形，长约5毫米，花时早落；花小，长约7毫米，内萼片椭圆形，子房倒卵形；而本种之叶片或多或少肉质，椭圆形，较小，1.5—4厘米×0.6—1.5（—2）厘米，基部楔形至近圆形，不偏斜；苞片长圆状卵形，长约2毫米，花时不脱落；花较大，长约10毫米，内萼片椭圆状卵形，子房圆形，易于区别。

17. 海南远志（植物分类学报）

Polygala hainanensis Chun et How in Acta Phytotax. Sin. 7: 5. 1958; 海南植物志 1: 367. 1964; 陈书坤, 植物分类学报 29: (3): 212. 1991; 广东植物志 2: 55, 图 36: 5—8, 1991, excl. *P. insularis* —— *P. dunniana* auct. non Lévl.; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 254. 1935.

17a. 海南远志（原变种）

var. *hainanensis*

直立或匍匐矮小亚灌木，高15—45厘米；茎单一或少分枝，基部木质，上部草质，疏被粉状微柔毛。单叶互生，叶片薄纸质，椭圆状长圆形或披针形，长3—12厘米，宽1—3.5厘米，先端渐尖，具短尖头，基部阔楔形，全缘，具缘毛，叶面深绿色，背面淡绿色，两面无毛或叶面疏被紧贴微柔毛，主脉上面微凹，背面隆起，侧脉6—9对，两面突起，弧曲，于边缘处网结，细脉网状，不明显；叶柄长1—1.5厘米，被短柔毛。总状花序顶生，长1.5—7.5厘米，被粉状微柔毛，花密集，花梗长1.5—2毫米，无毛，基部具1长约2毫米的、线形、早落小苞片；萼片5，花后脱落，外面3枚小而不等大，上面1枚小舟形，长3—3.5毫米，先端钝，侧面2枚长圆形，长1.7毫米，内面2枚花瓣状，倒卵形，长约6毫米，宽约3.5毫米，先端圆形，基部渐狭，具爪，7脉；花瓣3，白色，玫瑰红或紫色，侧生花瓣倒卵状长圆形，长约6毫米，2/3以下与龙骨瓣合生，先端钝，龙骨瓣较侧瓣略长，兜状，具2片顶端2浅裂的鸡冠状附属物；雄蕊8，花丝长约6毫米，2/3以下合生成鞘，并与花瓣贴生，花药卵形；子房圆形，径约1—1.5毫米，具