

渐增粗，并弯曲，柱头乳突状。蒴果近圆形，径约2毫米，几无翅，极疏被短柔毛，种子2粒，长圆形，长约1.5毫米，径约1毫米，黑色，密被白色短柔毛；种阜白色，3裂。

花果期7—10月。

产江苏、安徽、浙江、江西、台湾、广东、海南、广西和云南等省区；生于海岸边水旁瘠土、湿沙土以及中低海拔的山坡草地。分布于斯里兰卡、印度、孟加拉、泰国、柬埔寨、越南、马来西亚、印度尼西亚爪哇、菲律宾和巴布亚新几内亚。

本种全草药用，有散瘀止血、化痰止咳、解毒消肿之功能。

29. 单瓣远志（西藏植物志） 图版46：1—10

*Polygala monopetala* Camb. in Jacq. Voy. Bot. t. 27. 1835—44; 西藏植物志 3: 54, 图版18: 1—10. 1986; 陈书坤, 植物分类学报 29 (3): 220. 1991. — *P. sibirica* Linn. var. *monopetala* (Camb.) Chodat in Mem. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève 31 (2): 349. 1893. — *P. sibirica* auct. non Linn.; Benn. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 205. 1872. p. p.

多年生草本，高15—20厘米；主根粗，弯曲。暗灰褐色。茎短，多分枝，分枝纤细，被白色弯曲短柔毛。单叶互生，叶片厚纸质，线状披针形或椭圆状披针形，长1—1.8厘米，宽3—4毫米，先端渐尖，具短尖头，基部狭，全缘，反卷，叶面绿色，被卷曲短柔毛，背面淡绿色，无毛，主脉上面微凹，背面隆起，侧脉不明显；叶柄极短，被短柔毛。总状花序腋生或顶生，长约1.5厘米，被短柔毛，少花；花梗基部具苞片3枚，苞片披针形，不等大，短于花梗；萼片5，宿存，具缘毛，外面3枚披针形，几等大，长约2毫米，背面被短柔毛，内面2枚椭圆状长圆形，长约4毫米，宽约2毫米，先端急尖，沿中脉绿色，边缘几无色；花瓣2，淡紫色，侧瓣仅1枚，椭圆形，长约3.5毫米，基部内侧被短柔毛，龙骨瓣盔状，长约4毫米，基部楔形，顶端具小的2束多裂鸡冠状附属物；雄蕊6—8，花丝长约4毫米，3/4以下合生成鞘，3/4以上两侧各2或3枚合生，花药无柄，中间2枚分离；子房倒心状圆形，径约1毫米，花柱长2—2.5毫米，弯曲，柱头2，间隔排列。蒴果圆形，径约4毫米，顶端平截微凹，具短尖头，具狭翅及短缘毛；种子卵球形，黑色，被白色短柔毛，种阜3浅裂，侧裂片较长。花期7—8月，果期9—10月。

产西藏东南部；生于山坡林缘或草地中，海拔3000—3800米。分布于克什米尔地区。

30. 远志（本草经）蓼绕，蕤莞（尔雅、本草经），小草、细草（本草经），线儿茶，小草根（山东），神砂草、红籽细草（四川） 图版45：10—18

*Polygala tenuifolia* Willd. Sp. Pl. 3: 879. 1800; DC. Prodr. 1: 324. 1824; Forbes et Hemsl. in Journ Linn. Soc. Bot. 23: 62. 1886; Hand. — Mazz. Symb. Sin. 7: 633. 1933; Komarov, Fl. Mansh. 2: 679. 1904; Migo in Acta Phytotax. Geobot. 13: 88. 1943; Nevski et Tamamschjan in Schischk. et Bobr. Fl. URSS 14: 251. 1949; 中药志



图版 46 1—10. 单瓣远志 *Polygala monopetala* Camb.; 1. 植株, 2. 叶片, 3. 花, 4. 外萼片, 5. 内萼片, 6. 花冠展开, 示仅 1 枚侧瓣, 7. 雄蕊, 8. 雌蕊, 9. 果, 10. 种子. 11—20. 雅致远志 *P. elegans* Wall. ex Royle; 11. 植株, 12. 叶, 13. 花, 14. 外萼片, 15. 内萼片, 16. 花冠展开, 示雄蕊及鸡冠状附属物, 17. 雄蕊, 18. 雄蕊之一部分, 示花蕊开裂, 19. 雌蕊, 20. 果. (吴顺麟绘)