

分种检索表

1. 攀援灌木；叶面中脉和侧脉上被锈色粗伏毛，其余无毛，背面被锈色长柔毛；花两性，花瓣近匙形，先端明显2裂 1. 海南毒鼠子 *D. longipetalum* (Turcz.) Engl.
1. 小乔木或灌木；叶片两面无毛或仅背面沿中脉被短柔毛；花单性，雌雄异株，花瓣阔匙形，先端微裂或近全缘 2. 毒鼠子 *D. gelonioides* (Roxb.) Engl.

1. 海南毒鼠子 (海南植物志) 图版 48: 1—6


Dichapetalum longipetalum (Turcz.) Engl. in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 348. 1896; Leenhouts in Reinwardtia 4: 84. 1956, et in Steen. Fl. Mal ser. 1, 5: 314. 1957; 海南植物志 2: 203, 图 407. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 581, 图 2892. 1972. 广东植物志 2: 215, 图 137. 1991. — *Chailletia longipetala* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 36(1): 611. 1863; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 571. 1875. — *C. hainanensis* Hance in Journ. Bot. 23: 322. 1885. — *Dichapetalum hainanense* (Hance) Engl. in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 348. 1896; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 105. 1927. — *D. tonkinense* Engl. Bot. Jahrb. 23: 143. 1896; Pellegr. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1: 799. 1911.

攀援灌木，高3—4米；小枝被锈色长柔毛，老枝无毛，黑褐色，具散生灰色圆形皮孔。叶片纸质或半革质，长圆形，长圆状椭圆形或椭圆形，长8—17厘米，宽3—6厘米，先端渐尖，基部楔形、阔楔形或略圆形，叶面沿中脉和侧脉被锈色粗伏毛，余无毛，背面被锈色长柔毛，侧脉6—7对；叶柄长4—5毫米，被粗毛。聚伞花序腋生，被锈色柔毛；花两性，具短梗；萼片长圆形，长3—4毫米，外面密被灰色短柔毛；花瓣白色，近匙形，长约5毫米，无毛，先端2裂；雄蕊长约5毫米；腺体小，近方形，2浅裂；子房被灰褐色柔毛，花柱长于雄蕊，顶端3裂。核果偏斜倒心形或偏斜椭圆形，直径约2厘米，密被锈色短柔毛。花期7—翌年1月，果期1—6月。

产广东、广西、海南等省区；生于中海拔山地沟谷密林或疏林中。分布于中南半岛、马来半岛。

2. 毒鼠子 (海南植物志) 滇毒鼠子 (云南种子植物名录)

Dichapetalum gelonioides (Roxb.) Engl. in Engl. u Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (4): 348. 1896; Ridl. in Kew Bull. 372. 1930; Leenh. in Steen. Fl. Mal. ser. 1, 5: 310. 1957; 中国高等植物图鉴 2: 581, 图 2891. 1972; 云南种子植物名录, 上册 547. 1984; 广东植物志 2: 216. 1991. — *Moacurra gelonioides* Roxb. (Hort. Beng. 21. 1814, nom. nud.) Fl. Ind. 2: 69. 1832. — *Chailletia gelonioides* Bedd. Fl. Sylv. 3: 59, t. 9. fig. 1. 1871; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 570. 1875; Kurz, Fl. Burm.



图版 48 1—6. 海南毒鼠子 *Dichapetalum longipetalum* (Turcz.) Engl. : 1. 花枝, 2. 花, 3. 花瓣, 4. 花去花瓣, 示雄蕊和雌蕊, 5. 雌蕊, 6. 果。(邓盈丰绘)