

6. 叶片纸质;雄花花瓣线形或披针形,退化雌蕊顶端3裂,裂片披针形 5. 海南雀舌木 *L. hainanensis* (Merr. et Chun) Pojark.
6. 叶片膜质;雄花花瓣宽卵状三角形,退化雌蕊顶端3裂,裂片线形 6. 薄叶雀舌木 *L. australis* (Zoll. et Morr.) Pojark.
5. 子房和蒴果均光滑无毛;雄花无退化雌蕊。
7. 雄花的花盘腺体顶端不分裂 7. 缘腺雀舌木 *L. clarkei* (Hook. f.) Pojark.
7. 雄花的花盘腺体顶端2深裂或2裂至中部。
8. 叶片膜质至薄纸质,下面幼时被疏短柔毛;萼片卵形或宽卵形,浅绿色;雄花梗长6—10毫米 8. 雀儿舌头 *L. chinensis* (Bunge) Pojark.
8. 叶片革质,无毛;萼片长卵形,淡红色;雄花梗长2—2.5厘米 9. 厚叶雀舌木 *L. pachyphyllus* X. X. Chen

1. 线叶雀舌木(新拟)

Leptopus lolonum (Hand. -Mazz.) Pojark. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. 20:274. 1960; P. T. Li in Not. Roy. Bot. Gard. Endinb. 40(3):467. 1983. — *Andrachne lolonum* Hand.-Mazz. in Sitzgsanz. Akad. Wissensch. wien. 58:178. 1921, et Symb. Sin. 7:220. 1931.

小灌木;茎圆柱状,有皮孔;小枝具棱,节间长3—10毫米;芽鳞卵状三角形,长1—1.5毫米,边缘与托叶的边缘均被缘毛。叶片膜质,披针形或线状披针形,长1.5—4厘米,宽3—5毫米,顶端短渐尖,基部圆,叶面绿色,无毛,叶背淡绿色,密被长柔毛,有时枝下部的叶几无毛;侧脉每边4—6条,斜升至叶缘前网结,在叶背略凸起;叶柄长2—2.5毫米,被疏柔毛至无毛;托叶膜质,卵状心形,长约1毫米。花雌雄异株;雄花:1—2朵腋生;花梗丝状,长8—10毫米;花黄绿色,直径7—8毫米;萼片5,膜质,长圆形,长5毫米,宽1.5—2毫米,有脉纹,外面下部被疏柔毛;花瓣5,长2.5毫米,宽约0.5毫米;花盘比花瓣短,扁平,10裂至花盘的中部,裂片线形;雄蕊5,离生,花丝丝状,与花盘等长或略超过,花药小,卵形;退化雌蕊短小,无毛。

产于四川、贵州和云南等省,生于海拔2000—2500米山地灌木丛中。本种模式标本采自四川西昌。

2. 小叶雀舌木(新拟) 图版 2: 6—9

Leptopus nanus P. T. Li in Not. Roy. Bot. Gard. Endinb. 40(3):474, fig. 3. 1983.

直立灌木;茎上部和小枝具纵棱,节间长3—10毫米;除托叶边缘被缘毛外,其余均无毛。叶片厚纸质,卵形至卵状披针形,长5—10毫米,宽3—5毫米,顶端渐尖,基部圆;侧脉两面均不明显;叶柄长约1毫米或几无柄;托叶近膜质,卵状披针形,长1.5毫米。花雌雄异株;雌花:单生叶腋;花梗纤细,丝状,长5—6毫米;萼片5,分离,卵形,长和宽约1.5毫米,顶端钝或急尖;花瓣5,比萼片小一半,匙形,膜质;花盘膜质,与花瓣等长,10裂,中部以下合生;子房扁球状,3室,每室有2颗胚珠,花柱3,顶端2裂至中部。花期4月。

产于河北,生于灌木丛中。模式标本采自北京郊区南安河。