

米;萼片与雄花的相似,但较大,长 5—6 毫米;花瓣与雄花的相似,长约 1.5 毫米,宽约 0.7 毫米;花盘环状,10 裂至中部,裂片长圆形,顶端截形;子房卵圆形,3 室,花柱 3,直立,2 裂至基部。蒴果扁球状,直径约 8 毫米,无毛,成熟后开裂为 3 个 2 裂的分果片,外果皮薄,内果皮角质,基部有宿存的花萼;种子小,长约 3 毫米。

产于广西北部,常生于山谷、山坡、路旁灌木丛中或草丛中。模式标本采自环江县下南景阳。

叶供药用,可治皮肤溃疡,用于止血等。

3. 方鼎木属——*Archileptopus* P. T. Li

P. T. Li in Journ. South China Agr. Univ. 12(3): 38. 1991.

灌木。叶互生,全缘,羽状脉,具叶柄。花雌雄异株,1—2 朵腋生;花梗细长;萼片 5,覆瓦状排列;花瓣 5,比萼片短并且互生;花盘轮状,10 裂,裂片基部合生;雄蕊 5,离生,花丝丝状,基部膨大,花药外向,2 室,纵裂,基部着生;子房 4—5 室,每室 2 颗胚珠,花柱 4—5,顶端 2 裂。蒴果 4—5 室,每室室背 2 片分裂;种子每室 1—2 颗,肾状三棱形。

本属模式种:方鼎木 *Archileptopus fangdingianus* P. T. Li

1 种,产于我国广西西部。

1. 方鼎木(华南林业大学学报) 图版 5

Archileptopus fangdingianus P. T. Li in Journ. South China Agr. Univ. 12(3): 39, Pl. 1. 1991.

直立灌木,高达 1.5 米;小枝圆柱形;小枝、叶片下面和叶柄均在幼嫩时被短柔毛外,其余均无毛。叶片厚纸质,椭圆形或长椭圆形,长 3.5—11.5 厘米,宽 1.5—4 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形至钝,上面深绿色,下面浅绿色;中脉和侧脉在上面扁平,下面凸起,侧脉每边 4—6 条;叶柄长 3—10 毫米;托叶小,三角形,着生在叶柄基部两侧。花雌雄异株,1—2 朵腋生;雄花:花梗纤细,长达 1 厘米;萼片 5,覆瓦状排列,长圆形,长约 2 毫米,宽 0.7—1 毫米,顶端钝至近圆;花瓣 5,膜质,匙形,长约 1 毫米,与萼片互生;花盘膜质,轮状,10 裂,裂片长圆形,顶端近截形,基部合生;雄蕊 5,长约 1 毫米,基部膨大,离生,花药外向,2 室,纵裂;雌花:花梗长 2—2.5 厘米,顶端稍膨大;萼片 5,覆瓦状排列,长圆形,长达 3 毫米,宽 1—1.5 毫米;花瓣 5,膜质,匙形,长约 1.5 毫米;花盘与雄花的相同;子房近圆形,4—5 室,每室 2 颗胚珠,花柱 4—5,顶端 2 裂。蒴果近圆形,直径约 6 毫米,外果皮淡褐色,具有许多鳞片状凸起;果梗长达 2.5 厘米;种子每室 1—2 颗,肾状三棱形,长 2—3 毫米,淡栗色。花期 4—7 月,果期 7—10 月。

产于广西西部,生于海拔 900—1250 米石灰岩山地林中。模式标本采自那坡县百部乡弄化村弄布。



方鼎木 *Arebileptopus fangdingianus* P. T. Li: 1.花果枝; 2—3.雄花; 4.雄蕊;
5.雌花; 6.子房横切面, 示胚珠着生; 7.蒴果及宿存萼片; 8.种子。(黄少容绘)