

组 2. 单室土蜜树组——Sect. *Neogoetzea* (Pax) Jabl. in Engl. Pflanzenr. **65**(IV. 147. VIII): 83. 1915. — *Neogoetzea* Pax in Engl. Bot. Jahrb. 28, Beibl. 1:419. 1900. — *Bridelia* subsect. *Dubiae* Gehrm. in Engl. Bot. Jahrb. 41, Beibl. **95**:12. 1908. — *Bridelia* sect. *Dubiae* (Gehrm.) Jabl. in Engl. Pflanzenr. **65** (IV. 147. VIII): 85. 1915. — *Bridelia* subsect. *Cleistanthoideae* Gehrm. in Engl. Bot. Jahrb. 41. Beibl. **95**:12. 1908. — *Bridelia* sect. *Cleistanthoideae* (Gehrm.) Jabl. in Engl. Pflanzenr. **65**(IV. 147. VIII):71. 1915.

乔木或灌木。核果 1 室。

本组模式种为单室土蜜树 *Bridelia brideliifolia* (Pax) Fedde

我国产 3 种。

6. 波叶土蜜树(新拟) 图版 10: 6—9

Bridelia montana (Roxb.) Willd. Sp. Pl. **4**(2): 978. 1805; Roxb. Fl. Ind. **3**: 735. 1832; Muell. Arg. in DC. Prodr. **15**(2):500. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 269. 1887; Gehrm. in Engl. Bot. Jahrb. 41, Beibl. **95**:39. 1908; Jabl. in Engl. Pflanzenr. **65**(IV. 147. VIII): 86. 1915. — *Cluytia montana* Roxb. Corom. Pl. **3**:38. tab. 171. 1798.


乔木;除幼枝条、叶背脉、苞片被短柔毛或疏柔毛外,其余均无毛。叶片纸质,倒卵形,少数椭圆形,长 6—16 厘米,宽 2.5—10 厘米,顶端急尖至钝,基部宽楔形,叶面具光泽,叶背灰绿色,边缘浅波状;叶脉在叶面扁平,在叶背凸起,侧脉每边 8—18 条,斜升;叶柄长 3—10 毫米;托叶线状披针形,长 3—5 毫米。花小,雌雄同株,组成腋生团伞花序;花梗极短;苞片多数,小而短;雄花:长约 2.5 毫米;萼片卵状三角形;花瓣宽卵形,全缘;花盘杯状;雌花:长 2.5—3 毫米,直径 3—4 毫米;花梗极短;萼片窄三角形;花瓣卵形;花盘包围子房;子房卵圆形,花柱 2,长达 1 毫米,顶端 2 裂。核果圆球形,直径约 5 毫米,1 室,有宿存的萼片。染色体基数 $x = 13$ 。

产于云南东南部,生于海拔 1000—2000 米的山地疏林中。分布于印度、不丹、锡金和尼泊尔等。模式标本采自印度东部。

7. 膜叶土蜜树(新拟)

Bridelia pubescens Kurz in Journ. As. Soc. Bengal **42**: 241. 1873, et For Fl. 367. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**:270. 1887; Gehrm. in Engl. Bot. Jahrb. 41, Beibl. **95**:37. 1908; Jabl. Engl. Pflanzenr. **65**(IV. 147. VIII):73. 1915; Airy Shaw in Kew Bull. **26**(2):230. 1972.

乔木,高达 15 米;除小枝、叶背、托叶、花梗和萼片被柔毛或短柔毛外,其余均无毛。叶片膜质或近膜质,倒卵形、长圆形或椭圆状披针形,长 5—15 厘米,宽 2.5—7.5 厘米,顶端急尖至渐尖,基部钝至圆;侧脉每边 7—12 条,在叶背凸起;叶柄长 4—10 毫米;托叶线状



1—5.大叶土蜜树 *Bridelia fordii* Hance: 1.果枝; 2.花蕾; 3.雄花; 4.雌花; 5.核果。6—9.波叶土蜜树 *B. mantona* (Roxb.) Willd.: 6.果枝; 7.花蕾; 8.雄花; 9.核果。(黄少容绘)