

形, 2 室, 每室有 2 颗胚珠。核果常单生于叶腋, 圆球形, 直径 2—2.5 厘米, 外面被褐色糠状毛, 外果皮革质, 中果皮肉质, 较厚, 内果皮木质, 较中果皮薄, 2 室, 每室具 1 颗种子; 种子近椭圆形, 长 1.2 厘米; 果梗短, 长 5 毫米。花期 2—4 月, 果期 6—8 月。

产于海南省等地, 生于海拔 200—900 米山地林中。越南、泰国也有。模式标本采自海南五指山。

散孔材, 木材纹理通直, 结构密, 材质硬而重, 干燥后少开裂, 不变形, 适于机械器具、运动器械、建筑、家具、农具等用料。

4b. 长柄海南核果木(变种)

Drypetes hainanensis Merr. var. *longistipitata* P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 26:58. 1988.

与原变种的不同, 在于本变种的果梗较长, 长 1.5—2 厘米。

产于海南西南部, 生于海拔 400 米山地路旁或山腰密林中。模式标本采自海南三亚大田三角山。

组 3. 核果木组——Sect. *Drypetes*

有花盘; 雄蕊 4 至多数, 无退化雌蕊; 子房和核果 1 室。

本组模式种: 白背叶核果木 *Drypetes glauca* Vahl

本组我国产 5 种。

5. 网脉核果木(拉汉英种子植物名称) 白梨么(海南), 咪炸(广西) 图版 12: 5—8

Drypetes perreticulata Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 71: 260. 1924, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 570. 1927; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 34. 1934; 海南植物志 2: 138. 1965; Airy Shaw in Kew Bull. 26(2): 257. 1972.

乔木, 高达 16 米, 胸径达 30 厘米; 树皮灰黄色, 平滑; 小枝具棱, 幼时被红褐色短柔毛, 老时被毛脱落, 灰白色。叶片革质, 卵形、椭圆形或长圆形, 长 4.5—12 厘米, 宽 2.5—6 厘米, 顶端急尖, 基部宽楔形或圆, 两侧不相等, 叶缘上部具疏钝齿, 仅中脉幼时被短柔毛; 侧脉每边 6—8 条, 网脉密而明显; 叶柄长 3—6 毫米, 幼时被微毛, 后变无毛; 托叶线形, 宿存。雄花: 花梗极短, 常 2—3 朵簇生于叶腋, 基部具有几枚小苞片; 萼片 4, 稍不等长, 倒卵形或长圆形, 长 4.5—6.5 毫米, 略厚; 花盘扁平; 雄蕊约 25 枚, 花丝扁, 基部稍宽大, 花药长圆形; 无退化雌蕊; 雌花: 萼片和花盘与雄花的相同; 子房卵圆形, 1 室。核果常单生于叶腋, 卵形或椭圆形, 长 18—25 毫米, 宽 14—18 毫米, 平滑, 无毛, 成熟时暗红色, 外果皮革质, 中果皮肉质, 内果皮木质, 较中果皮薄, 1 室, 有种子 1 颗; 种子卵圆形, 长约 15 毫米, 外种皮脆壳质。花期 1—3 月, 果期 5—10 月。

产于广东、海南、广西、贵州、云南, 生于海拔 800 米以下山地林中。越南、泰国分布。本种模式标本采自泰国。