

形, 2 室, 每室有 2 颗胚珠。核果常单生于叶腋, 圆球形, 直径 2—2.5 厘米, 外面被褐色糠状毛, 外果皮革质, 中果皮肉质, 较厚, 内果皮木质, 较中果皮薄, 2 室, 每室具 1 颗种子; 种子近椭圆形, 长 1.2 厘米; 果梗短, 长 5 毫米。花期 2—4 月, 果期 6—8 月。

产于海南省等地, 生于海拔 200—900 米山地林中。越南、泰国也有。模式标本采自海南五指山。

散孔材, 木材纹理通直, 结构密, 材质硬而重, 干燥后少开裂, 不变形, 适于机械器具、运动器械、建筑、家具、农具等用料。

4b. 长柄海南核果木(变种)

Drypetes hainanensis Merr. var. *longistipitata* P. T. Li in *Acta Phytotax.* Sin. 26:58. 1988.

与原变种的不同, 在于本变种的果梗较长, 长 1.5—2 厘米。

产于海南西南部, 生于海拔 400 米山地路旁或山腰密林中。模式标本采自海南三亚大田三角山。

组 3. 核果木组——Sect. *Drypetes*

有花盘; 雄蕊 4 至多数, 无退化雌蕊; 子房和核果 1 室。

本组模式种: 白背叶核果木 *Drypetes glauca* Vahl


本组我国产 5 种。

5. 网脉核果木(拉汉英种子植物名称) 白梨么(海南), 咪炸(广西) 图版 12: 5—8

Drypetes perreticulata Gagnep. in *Bull. Soc. Bot. France* 71: 260. 1924, et in *Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné* 5: 570. 1927; Merr. et Chun in *Sunyatsenia* 2: 34. 1934; 海南植物志 2: 138. 1965; Airy Shaw in *Kew Bull.* 26(2): 257. 1972.

乔木, 高达 16 米, 胸径达 30 厘米; 树皮灰黄色, 平滑; 小枝具棱, 幼时被红褐色短柔毛, 老时被毛脱落, 灰白色。叶片革质, 卵形、椭圆形或长圆形, 长 4.5—12 厘米, 宽 2.5—6 厘米, 顶端急尖, 基部宽楔形或圆, 两侧不相等, 叶缘上部具疏钝齿, 仅中脉幼时被短柔毛; 侧脉每边 6—8 条, 网脉密而明显; 叶柄长 3—6 毫米, 幼时被微毛, 后变无毛; 托叶线形, 宿存。雄花: 花梗极短, 常 2—3 朵簇生于叶腋, 基部具有几枚小苞片; 萼片 4, 稍不等长, 倒卵形或长圆形, 长 4.5—6.5 毫米, 略厚; 花盘扁平; 雄蕊约 25 枚, 花丝扁, 基部稍宽大, 花药长圆形; 无退化雌蕊; 雌花: 萼片和花盘与雄花的相同; 子房卵圆形, 1 室。核果常单生于叶腋, 卵形或椭圆形, 长 18—25 毫米, 宽 14—18 毫米, 平滑, 无毛, 成熟时暗红色, 外果皮革质, 中果皮肉质, 内果皮木质, 较中果皮薄, 1 室, 有种子 1 颗; 种子卵圆形, 长约 15 毫米, 外种皮脆壳质。花期 1—3 月, 果期 5—10 月。

产于广东、海南、广西、贵州、云南, 生于海拔 800 米以下山地林中。越南、泰国有分布。本种模式标本采自泰国。



1—4.拱脉核果木 *Drypetes arcuatineria* Merr. et Chun: 1.花枝; 2.花蕾; 3.雄花; 4.核果;
5—8.网脉核果木 *D. perreticulata* Gagnep.: 5.花枝; 6.花蕾; 7.雄花; 8.核果。(黄少容绘)

散孔材,橙黄色,木材纹理略直,结构细致,材质坚硬而重,干后少开裂,稍有变形,适于建筑、车辆、机械器具、运动器械、雕刻等用料。

6. 勐腊核果木(植物分类学报)

Drypetes hoaensis Gagnep. in Bull. Sot. Bot. France **71**: 259. 1924, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné **5**: 570, fig. 70 (1). 1927; Airy Shaw in Kew Bull. **26** (2): 255. 1972; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. **26**: 59. 1988.

乔木,高达 20 米;枝条淡灰色,无毛。叶片革质,卵形至椭圆形,长 6—11 厘米,宽 2—5 厘米,顶端具短尾尖,有时钝,基部宽楔形至圆,两侧不相等,边缘具疏浅圆齿;侧脉每边 9—13 条,斜升至近叶缘,网脉干时两面均明显;叶柄长 5—10 毫米;托叶小,卵状三角形,常早落。雄花: 3—5 朵簇生于叶腋,花梗长 4 毫米;萼片 4,大小不相等,椭圆形,长 2—3 毫米,边缘有睫毛;雄蕊 12—15 枚,花丝丝状,花药长圆形;无退化雌蕊;雌花: 1—2 朵腋生;萼片与雄花的相同;子房卵圆形,1 室。核果卵珠状,长 1—2 厘米,直径 0.8—1.5 厘米,无毛,1 室,1 种子;果梗长约 6 毫米。

产于云南南部,生于山地沟谷密林中。分布于泰国和越南。模式标本采自越南登巴。

7. 拱网核果木(海南植物志) 图版 12: 1—4

Drypetes arcuatinervia Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**: 95. 1940; 海南植物志 **2**: 138. 1965. —*Drypetes arcuatinervia* Merr. et Chun var. *elongata* Merr. et Chun in l. c. 96.

直立灌木,高达 4 米;枝条密被皮孔;小枝略扁或圆柱形;除果外,全株均无毛。叶片纸质或近革质,长圆形、长圆状披针形或披针形,稀椭圆形,长 6—15 厘米,宽 2—6 厘米,顶端渐尖,基部钝,边缘具疏钝锯齿;侧脉每边 7—8 条,网脉疏离;叶柄长 2—5 毫米。花组成长达 7 厘米的总状或圆锥花序,或有时簇生于叶腋或顶生;雄花: 花梗长约 2 毫米;萼片 4—5,稀 6,椭圆形或近圆形,边缘呈齿状撕裂;花盘 4—6 裂;雄蕊 4—6,着生于花盘的凹缺处,花丝短而稍扁,花药近圆形;无退化雌蕊;雌花: 萼片和花盘与雄花的相同;子房卵圆形,1 室。核果单生或 2—5 个组成总状果序,腋生或顶生于小枝上部,果梗长约 2 毫米;果卵圆形,长约 1 厘米,顶端急尖,有时呈喙状,1 室,1 种子,外果皮近革质,被短柔毛,中果皮木质,内果皮硬壳质;种子卵形,长 7—8 毫米,顶端具小短尖头,种皮薄,有几条稍隆起的纵肋。花期 4—10 月,果期 8 月—翌年 4 月。

产于广东、海南、广西、云南,生于山地沟谷或山坡疏林中。越南也有。模式标本采自海南保亭太平岗。

8. 钝叶核果木(海南植物志)

Drypetes obtusa Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**: 96. 1940; 海南植物志 **2**: 139. 1965.

小乔木,高约 7 米;枝条灰白色,干后皱缩而粗糙,小枝有时稍扁,有不明显的沟纹,幼