

散孔材,橙黄色,木材纹理略直,结构细致,材质坚硬而重,干后少开裂,稍有变形,适于建筑、车辆、机械器具、运动器械、雕刻等用料。

6. 勐腊核果木(植物分类学报)

Drypetes hoaensis Gagnep. in Bull. Sot. Bot. France **71**: 259. 1924, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné **5**: 570, fig. 70 (1). 1927; Airy Shaw in Kew Bull. **26** (2): 255. 1972; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. **26**: 59. 1988.

乔木,高达 20 米;枝条淡灰色,无毛。叶片革质,卵形至椭圆形,长 6—11 厘米,宽 2—5 厘米,顶端具短尾尖,有时钝,基部宽楔形至圆,两侧不相等,边缘具疏浅圆齿;侧脉每边 9—13 条,斜升至近叶缘,网脉干时两面均明显;叶柄长 5—10 毫米;托叶小,卵状三角形,常早落。雄花: 3—5 朵簇生于叶腋,花梗长 4 毫米;萼片 4,大小不相等,椭圆形,长 2—3 毫米,边缘有睫毛;雄蕊 12—15 枚,花丝丝状,花药长圆形;无退化雌蕊;雌花: 1—2 朵腋生;萼片与雄花的相同;子房卵圆形,1 室。核果卵珠状,长 1—2 厘米,直径 0.8—1.5 厘米,无毛,1 室,1 种子;果梗长约 6 毫米。

产于云南南部,生于山地沟谷密林中。分布于泰国和越南。模式标本采自越南登巴。

7. 拱网核果木(海南植物志) 图版 12: 1—4

Drypetes arcuatinervia Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**: 95. 1940; 海南植物志 **2**: 138. 1965. —*Drypetes arcuatinervia* Merr. et Chun var. *elongata* Merr. et Chun in l. c. 96.


直立灌木,高达 4 米;枝条密被皮孔;小枝略扁或圆柱形;除果外,全株均无毛。叶片纸质或近革质,长圆形、长圆状披针形或披针形,稀椭圆形,长 6—15 厘米,宽 2—6 厘米,顶端渐尖,基部钝,边缘具疏钝锯齿;侧脉每边 7—8 条,网脉疏离;叶柄长 2—5 毫米。花组成长达 7 厘米的总状或圆锥花序,或有时簇生于叶腋或顶生;雄花: 花梗长约 2 毫米;萼片 4—5,稀 6,椭圆形或近圆形,边缘呈齿状撕裂;花盘 4—6 裂;雄蕊 4—6,着生于花盘的凹缺处,花丝短而稍扁,花药近圆形;无退化雌蕊;雌花: 萼片和花盘与雄花的相同;子房卵圆形,1 室。核果单生或 2—5 个组成总状果序,腋生或顶生于小枝上部,果梗长约 2 毫米;果卵圆形,长约 1 厘米,顶端急尖,有时呈喙状,1 室,1 种子,外果皮近革质,被短柔毛,中果皮木质,内果皮硬壳质;种子卵形,长 7—8 毫米,顶端具小短尖头,种皮薄,有几条稍隆起的纵肋。花期 4—10 月,果期 8 月—翌年 4 月。

产于广东、海南、广西、云南,生于山地沟谷或山坡疏林中。越南也有。模式标本采自海南保亭太平岗。

8. 钝叶核果木(海南植物志)

Drypetes obtusa Merr. et Chun in Sunyatsenia **5**: 96. 1940; 海南植物志 **2**: 139. 1965.

小乔木,高约 7 米;枝条灰白色,干后皱缩而粗糙,小枝有时稍扁,有不明显的沟纹,幼



1—4.拱脉核果木 *Drypetes arcuatineria* Merr. et Chun: 1.花枝; 2.花蕾; 3.雄花; 4.核果;
5—8.网脉核果木 *D. perreticulata* Gagnep.: 5.花枝; 6.花蕾; 7.雄花; 8.核果。(黄少容绘)