

时略被短柔毛。叶片纸质或近革质,长圆形,长4—8厘米,宽1.5—3.5厘米,顶端钝,有时微凹,基部楔形,全缘,叶面干时橄榄绿色,背面颜色较淡;侧脉每边8—10条,不明显;叶柄长6—8毫米。花未见。核果单生于叶腋,近椭圆形,长约1.5厘米,宽约1厘米,常有皱纹,被柔毛,1室,内有1种子,外果皮革质,中果皮木质,厚约1毫米,内果皮硬壳质,宿存花柱极短,柱头2,折扇形。果期6—8月。

产于广东、海南、广西、云南,生于山地阔叶林中。越南也有。模式标本采自海南保亭。

9. 全缘叶核果木(海南植物志)

Drypetes integrifolia Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 97. 1940; 海南植物志 2: 138. 1965.

直立灌木。叶片纸质或近革质,椭圆形至长圆形,长8—16厘米,宽3—6.5厘米,顶端钝至短渐尖,基部宽楔形,全缘或上部具不明显的钝齿,无毛;侧脉每边10—12条,不明显;叶柄长6—9毫米,粗壮,无毛。花未见。核果双生于小枝上部的叶腋或顶生;果梗长2毫米;果长圆形,长约12毫米,直径7毫米,顶端渐狭窄,外面被短柔毛,1室,内有种子1颗,外果皮干时革质,中果皮木质,内果皮硬壳质,宿存的花柱极短,柱头2裂,近折扇形;种子椭圆形,长约8毫米,直径5毫米,胚乳丰富;宿存萼片6,卵形或椭圆状卵形,长约3.5毫米,边缘有睫毛。果期8—9月。

产于广东、海南和广西,生于溪边疏林中。模式标本采自海南三亚豆守岭。

组4. 蒴果木组——Sect. *Stenogynium* (Muell. Arg.) P. T. Li, comb. nov. — *Cyclostemon* sect. *Stenogynium* Muell. Arg. in Linnaea 32: 81. 1863, et in DC. Prodr. 15(2): 481. 1866.

雄蕊4—15,有退化雌蕊。蒴果,1—3室。

本组模式种: 核果木 *Drypetes indica* (Muell. Arg.) Pax et Hoffm.

本组我国产4种。

10. 密花核果木(海南植物志) 红枣(海南崖县),密花核实(海南主要经济树木) 图版 13: 2—6

Drypetes congestiflora Chun et T. Chen in Acta Phytotax. Sin. 8: 275. 1963, et 海南植物志 2: 140. 1965. — *Drypetes confertiflora* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 259, fig. 29 A-B. 1935; 朱志淞, 海南主要经济树木 418. 1964; non Pax et Hoffm. (1921).

乔木,高达12米,胸径达35厘米;树皮灰褐色,内皮淡黄色;小枝、叶柄、小苞片被短柔毛外,其余无毛。叶片革质,长圆形或长卵形,长4.5—6厘米,宽2—4厘米,顶端渐尖,基部近圆,两侧不相等,边缘有明显的钝齿;侧脉每边约7条,较明显;叶柄长4—10毫米。雄花密集地簇生于叶腋;花梗长2—4毫米;小苞片宽卵形,长约1毫米;萼片4,倒卵形或