

et Chun in Sunyatsenia 2: 258. 1935: 海南植物志 2: 140. 1965. — *D. karapine-nsis* (Hayata) Pax et Hoffm. var. *hieranensis* (Hayata) Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Tokyo Bot. III, 6(6): 334. 1954. — *D. longipes* X. H. Song in Journ. Nanjing Inst. For. 1: 74, fig. 1. 1986.

乔木,高达15米;枝条伸长,小枝密被皮孔;除萼片外面、子房和果被柔毛外,全株均无毛。叶片革质或厚纸质,椭圆状长圆形、卵状长圆形、长圆状披针形或披针形,长8—15厘米,宽3—6厘米,顶端尾状渐尖,尖头钝,基部楔形至钝,两侧常不相等,全缘;侧脉每边6—8条,网脉密而明显;叶柄长3—10毫米,干后常有横皱纹。雌雄异株,稀同株,总状花序腋生或顶生;雄花:花梗长2—5毫米;萼片4,长约2毫米;花盘圆盘状,边缘稍隆起,浅裂;雄蕊4—8,着生于花盘浅裂凹缺处,花丝圆柱形,花药椭圆形至近圆形;雌花:花梗长达2厘米;萼片与雄花的相同;子房圆球形,2—3室,花柱2,伸长,柱头盾状,顶端全缘。蒴果单生或数个组成总状呈圆球形,直径12—18毫米,顶端稍压,2—3室,每室具1个种子,外果皮干时近革质,内果皮纸质;果梗长2.5—4厘米。花果期11月—翌年2月。

产于台湾、广东、海南、广西、贵州、云南,生于海拔400—1600米山地林中。分布于印度、锡金、缅甸、泰国等。模式标本采自印度东北部卡西亚。

13. 柳叶核果木(植物分类学报)

Drypetes salicifolia Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 71: 261. 1924. et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 565, fig. 69(5—12), et 70(3). 1927; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 26: 58. 1988.

乔木,高达10米;小枝具棱,除萼片、子房、果和果梗被短柔毛外,其余均无毛。叶片纸质,线状长圆形,长8—16厘米,宽1.5—3厘米,顶端渐尖,基部楔形,叶背常具有黑色小斑点;中脉和侧脉两面均凸起,侧脉8—14条,斜升,至叶缘前网结,网脉略明显;叶柄长5—8毫米;托叶2,长圆形,长约1毫米,生于叶柄基部两侧。花雌雄异株,小,1—3朵腋生;雄花:花梗短;萼片4,倒卵形,2轮,内轮比外轮的狭;雄蕊12,花丝分离,花药长圆形;退化雌蕊杯状,顶端4裂;雌花:单生;花梗极短;萼片4,外轮的长圆形,长约5毫米,内轮的椭圆形;花盘环状,4—5裂,裂片顶端钝;子房卵圆形,2室,花柱2,顶端扩大呈盾形或平凹。蒴果圆球形,直径达2厘米,黄褐色,常1室发育,内有1种子;果梗长2—4毫米。

产于云南南部,生于山地常绿阔叶林中。越南、老挝也有。模式标本采自老挝。

5. 五月茶族——Trib. ANTIDESMEAE Sweet

Sweet, Hort. Brit. ed. 2, 410. 1830; Hurusawa in Journ. Fac. Sci.