

1920. — *A. pentandrum* (Blanco) Merr. var. *rotundisepalum* (Hayata) Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Bot. III, 6(6): 327. 1954.

灌木;多分枝,小枝幼时被微毛,后被毛脱落。叶片纸质,椭圆形或卵状长圆形,长6—8厘米,宽3—3.5厘米,顶端急尖,基部钝,叶腋内有髯毛;叶柄长5—10毫米。总状花序腋生或顶生,长7—8厘米,不分枝;雄花:花梗初被微毛,后变无毛;萼片4,宽卵形,外面被长硬毛;雄蕊4,伸出花萼之外,花丝长,着生于花盘之内;花盘垫状;退化雌蕊小,倒圆锥形;雌花:花梗短;苞片长圆状披针形,与花梗等长;萼片5,长三角形,不等长,内面基部被粗硬毛;花盘与雄花同;子房卵圆形,无毛。核果宽卵形,长约6毫米,直径3—4毫米,淡红色;果梗长1—2毫米。

产于台湾南部和东部,生于海拔150—300米山地疏林中。菲律宾也有。模式标本采自菲律宾北部。

6. 叶下珠族——Trib. PHYLLANTHEAE

Dumort. in Anal. Fam. Pl. 45. 1829.

乔木、灌木或草本。单叶,全缘,通常羽状脉。花单性,单生、簇生或组成各式花序。花萼合生或4—6裂;花瓣和花盘存在或缺一,或全无;雄蕊2—8,花丝合生或离生,花药2室,通常纵裂,药隔通常不突起;子房1—15室,每室胚珠2,花柱分离或合生成柱状。果实通常为蒴果,或呈浆果状或核果状,不开裂或开裂成3个分果片。

本族模式属:叶下珠属 *Phyllanthus* Linn.

本族我国产10属。

8. 白饭树属*——*Flueggea* Willd.

Wills. Sp. Pl. 4: 637, 757. 1805; Webster in Allertonia 3(4):273.

1984. — *Acidoton* P. Br. Civ. Nat. Hist. Jamaica 335. 1756;

nom. rejic.; non *Acidoton* Sw. (1788); nom. cons. — *Securinega*

sect. *Fluggea* Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 448. 1866. —

Acidoton sect. *Flueggea* Post et Kuntze, Lex. Gen. Phan. 5. 1903.

直立灌木或小乔木,通常无刺。单叶互生,常排成2列,全缘或有细钝齿;羽状脉;叶柄短;具有托叶。花小,雌雄异株,稀同株,单生、簇生或组成密集聚伞花序;苞片不明显;无花瓣;雄花:花梗纤细;萼片4—7,覆瓦状排列,边缘全缘或有锯齿;雄蕊4—7,着生在

* 白饭树属(种子植物名称),异名:一叶萩属(植物学大辞典),金柑藤属(植物学名词审查本)。

花盘基部,且与花盘腺体互生,顶端长过萼片,花丝分离,花药直立,外向,2室,纵裂;花盘腺体4—7,分离或靠合,稀为合生;花粉粒近圆球状,具3孔沟;退化雌蕊小,2—3裂,裂片伸长;雌花:花梗圆柱形或具棱;萼片与雄花的相同;花盘碟状或盘状,全缘或分裂;子房3(稀2或4)室,分离,每室有横生胚珠2颗,花柱3,分离,顶端2裂或全缘。蒴果,圆球形或三棱形,基部有宿存的萼片,果皮革质或肉质,3片裂或不裂而呈浆果状;中轴宿存;种子通常三棱形,种皮脆壳质,平滑或有疣状凸起,胚乳丰富,胚直或弯曲,子叶扁而宽,长于胚根。

本属模式种:聚花白饭树 *Flueggea leucopyra* Willd.

约12种,分布于亚洲、美洲、欧洲及非洲的热带至温带地区。我国产4种,除西北外,全国各省区均有分布。

本属与 *Securinega* Comm. ex Juss. 属特征很相近,不同之处在于后者花药内向,胚珠倒生,花粉粒孔沟短,雄花近无梗,仅分布于印度洋群岛。我国一些植物标本室定名及书籍,认为我国有产 *Securinega* Comm. ex Juss. 属植物。现笔者检查这类植物,其花药外向,胚珠横生,花粉粒孔沟长,雄花明显具梗,应属于 *Flueggea* Willd. 属植物。*Securinega* Comm. ex Juss. 属我国不产。

分种检索表

1. 植株无刺。

2. 叶片全缘或间中有不整齐的波状齿或细锯齿,下面浅绿色;蒴果三棱状扁球形,淡红褐色,果皮开裂 1. 一叶萩 *F. suffruticosa* (Pall.) Baill.
2. 叶片全缘,下面白绿色;蒴果浆果状,近圆球形,淡白色,果皮不开裂 2. 白饭树 *F. virosa* (Roxb. ex Willd.) Voigt

1. 植株有刺。

3. 枝条具棱;茎上部、小枝、叶、叶柄、花梗、子房和蒴果均被短柔毛或微毛;叶片长3—7毫米,宽2—5毫米;花单生或簇生;雄花的萼片、雄蕊和花盘腺体均为6枚 3. 毛白饭树 *F. acicularis* (Croiz.) Webster
3. 枝条圆柱形;全株无毛;叶片长1.3—2.5厘米,宽1—1.5厘米;花多朵组成聚伞花序;雄花的萼片、雄蕊和花盘腺体均为5枚 4. 聚花白饭树 *F. leucopyra* Willd.

1. 一叶萩(日名) 山嵩树(安徽),狗梢条(吉林),白几木(广西),叶底珠(中国高等植物图鉴) 图版 19:4—9

Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill. Étud. Gén. Euphorb. 502. 1858, et in Nouv. Arch. Mus. Paris II, 7: 76. 1884; Walk. Fl. Okinawa 626. 1976; Webster in Allertonia 3(4): 279. 1984. — *Pharnaceum? suffruticosum* Pall. Reise Russ. Reichs 3(2): 716, Pl. E, fig. 2. 1776. — *Chenopodium? suffruticosum* Pall. Reise Russ. Reichs 3(1): 424. 1776; nomen. — *Xylophylla ramiflora* Ait. Hort. Kew. 1: 376.