

本亚属模式：卡斯特叶下珠 *Phyllanthus casticum* Willem.

约 35 种,我国产 4 种。

组 1. 异萼叶下珠组——Sect. *Anisonema* (A. Juss.) Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 34. 1859; Webster in Journ. Arn. Arb. 38: 56. 1957. — *Anisonema* A. Juss. Euphorb. Tent. 19. 1824.

灌木或小乔木。叶具明显的叶脉。雌雄同株,具长梗;雄花多朵和雌花 1—2 朵组成聚伞花序;雄花:萼片 4—6,不相等,全缘;花盘全裂;雄蕊 5,不等长,内面 2 枚花丝合生,外面 3 枚花丝短而离生,花药外向,药室纵裂;花粉粒圆球状,3 孔沟,有网纹;雌花:萼片 5—6,不等长,全缘;花盘分裂或部分粘合;子房平滑,3—12 室,花柱通常厚而肉质,顶端略 2 裂。蒴果呈浆果状;种子三棱形。

本组模式种:小果叶下珠 *Phyllanthus reticulatus* Poir.

约 10 种,我国产 2 种。

1. 少子叶下珠(植物分类学报) 新竹油树(台湾植物志)

Phyllanthus oligospermus Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 93. 1920; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 356. 1936; H. Keng in Taiwania 6: 62. 1955; Li, Woody Fl. Taiwan 436. 1963; Hsieh in Li, Fl. Taiwan 3: 491. 1977; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin 25(5): 371. 1987.

灌木;枝条纤细,淡紫红色;全株无毛。叶片纸质,长圆形或椭圆形,长 2—3 厘米,宽 1—1.2 厘米,顶端钝,有硬尖头,基部楔形,下面略灰白色;叶柄长 2 毫米。雌雄同株,4—5 朵腋生;雄花:花梗丝状,长约 4 毫米;萼片 4—5,长圆形或倒卵形,长约 2 毫米,宽 1—1.5 毫米,顶端钝至圆;雄蕊 3—5,花丝离生,长约 1.5 毫米,花药肾形;花盘微裂;雌花:花梗长 3 毫米;萼片 5—6,长圆状披针形,长约 2.5 毫米,子房宽卵圆形,长 1.5 毫米,宽 1 毫米,花柱 3,长 0.3 毫米,基部合生。蒴果呈浆果状,圆球状,直径约 8 毫米,内有种子 4 颗;种子三棱形,长约 3 毫米,宽 2.5 毫米。花期 6—7 月,果期 7—8 月。

产于台湾北部,生于山地灌木林中。模式标本采自新竹。

2. 小果叶下珠(云南种子植物名录) 龙眼睛(广东),通城虎(广西北流),山丘豆(云南玉溪),飞檫木(海南澄迈),白仔(台湾),烂头钵(广州),多花油柑(台湾植物志)

Phyllanthus reticulatus Poir. in Lam. Encycl. Meth. 5: 298. 1804; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 344. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 288. 1887; Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 575. 1927; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 357, fig. 312. 1936; H. Keng in Taiwania 6: 62. 1955; Webster in Journ. Arn. Arb. 38: 57, text-fig. 7. 1957; Back. et Bakh. f. Fl. Java 1: 467. 1963; Li, Woody Fl. Taiwan 436. 1963; 海南植物志 2: 128. 1965; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 322. 1972,