

本变种与原变种的不同,在于本变种的幼枝、叶及花均无毛。

产于台湾、广东、海南、广西、贵州和云南等省区,生于山地疏林下、山谷及灌木丛中。分布于印度、斯里兰卡和印度尼西亚等。模式标本采自印度东部。

组 2. 白饭叶下珠组——Sect. *Flueggeopsis* Muell. Arg. in *Linnaea* 32: 2. 1863, et in DC. Prodr. 15 (2): 348. 1866; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* 5: 286. 1887; Gagnep. in *Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné* 5: 571. 1927; P. T. Li in *Acta Phytotax. Sin.* 25 (5): 372. 1987.

灌木或小乔木。叶二列,具叶柄。萼片 5—6,排成 2 轮;雄蕊 5,花丝离生,花药直立,药室纵裂,药隔不突起;花盘腺体 6 或环状;子房 3 室,花柱 3;基部合生,顶端全缘。蒴果呈浆果状,3 室;种子每室 1 种。

本组模式种:青灰叶下珠 *Phyllanthus glaucus* Wall. ex Muell Arg.

约 5 种,分布于印度、不丹、锡金、尼泊尔、中国、日本、越南、柬埔寨、老挝、菲律宾等。我国产 2 种。

3. 青灰叶下珠(植物分类学报) 图版 22: 4—6

Phyllanthus glaucus Wall. ex Muell. Arg. in *Linnaea* 32: 14. 1863; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* 5: 288. 1887; Hemsl. in *Journ. Linn. Soc. Bot.* 26: 421. 1894; Hutch. in *Sarg. Pl. Wilson.* 2: 520. 1916; Hand.-Mazz. *Symb. Sin.* 7: 222. 1931; Airy Shaw in *Kew Bull.* 25: 493. 1971; 中国高等植物图鉴 2: 588. 图 2905. 1972; 湖北植物志 2: 362. 图 1261. 1979; Chin in *Acta Phytotax. Sin.* 19: 346. 1981; non Muell. Arg. (1865). —*Phyllanthus fluggeiformis* Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 349. 1866.

灌木,高达 4 米;枝条圆柱形,小枝细柔;全株无毛。叶片膜质,椭圆形或长圆形,长 2.5—5 厘米,宽 1.5—2.5 厘米,顶端急尖,有小尖头,基部钝至圆,下面稍苍白色;侧脉每边 8—10 条;叶柄长 2—4 毫米;托叶卵状披针形,膜质。花直径约 3 毫米,数朵簇生于叶腋;花梗丝状,顶端稍粗;雄花:花梗长约 8 毫米;萼片 6,卵形;花盘腺体 6;雄蕊 5,花丝分离,药室纵裂;花粉粒圆球形,具 3 孔沟,沟细长,内孔圆形;雌花:通常 1 朵与数朵雄花同生于叶腋;花梗长约 9 毫米;萼片 6,卵形;花盘环状;子房卵圆形,3 室,每室 2 颗胚珠,花柱 3,基部合生。蒴果浆果状,直径约 1 厘米,紫黑色,基部有宿存的萼片;种子黄褐色。花期 4—7 月,果期 7—10 月。

产于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南和西藏等省区,生于海拔 200—1000 米的山地灌木丛中或稀疏林下。分布于印度、不丹、锡金、尼泊尔等。模式标本采自印度。

药用,根可治小儿疳积病。



1—3. 小果叶下珠 *Phyllanthus reticulatus* Poir. var. *reticulatus*; 1. 果枝; 2. 雄花; 3. 浆果。
4—6. 青灰叶下珠 *P. glaucus* Wall. ex Muell. Arg.; 4. 花枝; 5. 雄花; 6. 雌花。7—10. 落萼叶下珠
P. flexuosus (Sieb. et Zucc.) Muell. Arg.; 7. 果枝; 8. 雄花; 9. 雌花; 10. 蒴果。(黄少容绘)