

灌木。叶二列，互生。雄花：萼片和花盘腺体或裂片 4；雄蕊 2，花丝通常合生成柱状，药室 2；雌花：萼片 5—6；花盘盘状或 5—6 裂；子房 3 室，花柱 3。蒴果。

本组模式种：急尖叶下珠 *Phyllanthus acutissimus* Miq.

本组我国产 7 种。

18. 单花水油甘(植物分类学报) 图版 27:1—6

Phyllanthus nanellus P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 376, fig. 1. 1987.

灌木，高约 1 米；茎圆柱形，灰褐色；枝条棱，生叶小枝扁，两侧具翅，小枝互生或 2—4 枝簇生；全株无毛。叶二列，叶片薄革质，卵形或长卵形，长 4—5 毫米，宽 2 毫米，顶端具凸尖，基部偏斜；侧脉每边 3 条，在叶上面略明显，在叶下面不明显；叶柄极短或无；托叶三角形，两侧边缘膜质。花雌雄同株，通常单朵腋生；花梗长约 2 毫米；雄花：萼片 4，近圆形，长 1 毫米，边缘膜质；雄蕊 2，花丝合生成柱状，花药平行，药室 2；花盘腺体 4，长卵形；雌花：萼片 6，宽卵形，长约 1.2 毫米；花盘盘状，围绕子房基部；子房圆球状，3 室，每室 2 颗胚珠，花柱 3，顶端 2 裂。蒴果圆球状，直径约 3 毫米，棕褐色，3 瓣裂；轴柱和萼片宿存。

产于海南三亚、白沙、定安、乐会、保亭、东方、琼中、陵水等地，生于海拔 300—400 米山谷林下或溪旁灌木丛中。模式标本采自三亚(崖县)山满头。

19. 隐脉叶下珠(植物分类学报) 图版 29:6—9


Phyllanthus guangdongensis P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 375, fig. 2. 1987.

灌木，高约 1 米；茎和枝条圆柱形；全株均无毛。叶片纸质，椭圆形或卵形，长 3—4.5 厘米，宽 1.3—1.7 厘米，顶端短渐尖，基部圆；侧脉 6—9 条，不明显；叶柄长 2—3 毫米；托叶宽三角形，长约 1 毫米。花雌雄同株，红色，1—2 朵腋生；雄花：生于花枝的下部，花梗纤细，长 5—7 毫米；萼片 4，宽卵形，长 2 毫米，宽 1.5 毫米，全缘；花盘 4 裂；裂片半圆形；雄蕊 2，花丝合生成短柱，药室纵裂；雌花：生于花枝的上部，花梗长 2—5 厘米；萼片 6，宽卵形，长 3 毫米，宽 2 毫米；花盘盘形，全缘，围绕子房基部；子房圆球状，3 室，每室 2 颗胚珠，花柱 3，平展，贴于子房顶部，顶部 2 裂至中部，裂片外弯。蒴果圆球状，直径达 7 毫米，基部有宿存的萼片；果梗长 2.5—5 厘米。花期 10—11 月，果期 11—12 月。

产于广东西部和西南部，生于海拔 300—500 米山地疏林下。模式标本采自封开县黑石顶。

20. 贵州叶下珠(拉汉种子植物名称) 图版 30

Phyllanthus bodinieri (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 18: 212. 1937; Croiz. in Journ. Jap. Bot. 16: 654. 1940; Lauener in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 27: 9. 1966, et 40: 484. 1983; P.T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 373. 1987. —*Sterculia*



1—6. 单花水油甘 *Phyllanthus nanellus* P. T. Li: 1. 花枝; 2. 花枝一段(放大); 3. 雄花; 4. 雌花;
 5. 子房横切面, 示胚珠着生; 6. 轴柱及苞片。7—10. 水油甘 *P. parvifolius* Buch. -Ham. ex D. Don:
 7. 花枝; 8. 花枝一段(放大); 9. 雄花; 10. 雌花。(黄少容绘)