

bodinieri Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 406. 1915.

灌木;枝条淡灰色,有皮孔;小枝具棱翅;全株无毛。叶二列,叶片近革质,卵状披针形,长2—3.5厘米,宽8—12毫米,顶端渐尖,基部宽楔形,边缘干时反卷,上面淡黄绿色,下面淡棕色;中脉两面凸起,侧脉每边4—5条,不明显;叶柄长约1毫米。花雌雄同株,紫红色,多达7朵簇生于小枝两侧叶腋内;雄花:直径约4毫米;花梗纤细,长3—7毫米;萼片4,宽卵形,全缘;花盘腺体4,宽椭圆形,分离,平展,中部内凹;雄蕊2,合生,药室2,横裂;雌花:直径4—4.5毫米,花梗长6—10毫米;萼片6,宽卵形;花盘杯状;子房圆球状,3室,花柱3,顶端2裂。蒴果圆球状,成熟后3瓣裂。

产于贵州东南部和广西东南部。生于山地疏林下。模式标本采自贵州黄果树。

根、叶供药用,槌烂外敷可治跌打损伤。

21. 尖叶下珠(植物分类学报) 图版 29:1—5

Phyllanthus fanchenensis P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 377, fig. 3. 1987.

灌木,高约1米;茎圆柱形,淡褐色;小枝条灰绿色,具翅,有皮孔。叶二列,叶片纸质,披针形,长2—6厘米,宽7—13毫米,基部圆或钝,上面深绿色,下面淡绿色,叶缘干时背卷;侧脉每边3—4条,不很明显;叶柄长1—2毫米;托叶三角形,长约2毫米,褐色,边缘膜质。花淡白色,单朵雄花和2—3朵雌花同簇生于叶腋;雄花:花梗纤细,1—1.5厘米;萼片4,宽卵形,长约2毫米,宽1.7毫米,顶端圆;雄蕊2,花丝合生,花药2室,纵裂;花盘腺体4,肾形或半圆形,全缘,与萼片互生;雌花:花梗长2—2.3厘米;萼片6,2轮,每轮3片,卵形至宽卵形,长2—2.5毫米,宽1.5—2毫米,全缘;花盘盘状,肉质,顶端近全缘,围绕子房基部;子房圆球状,直径约2毫米,3室,每室2颗胚珠,花柱3,分离,顶端2裂至2/3,裂片线形,内弯。蒴果圆球状,直径约5毫米,淡红色,成熟后3瓣裂,轴柱和萼片宿存;果梗长2.3—3厘米。

产于广西东南部,生于海拔206米山谷、河旁灌木丛中。模式标本采自防城十万大山平旺乡双峰山。

22. 落羽松叶下珠(植物分类学报) 滇橄榄(云南潞西)

Phyllanthus taxodiifolius Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 605. 1927; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 325. 1972; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 373. 1987.

灌木,高达2米;枝条四棱形,长达5厘米;全株无毛。叶紧密排成二列,叶片纸质,线状长圆形,长约6毫米,宽1—2毫米,两端钝;侧脉不明显;叶柄极短;托叶披针形,长约2毫米。花雌雄同株,组成团伞花序,生于小枝下部叶腋内;雄花:花梗丝状,长约2毫米;萼片4,倒卵形,长约1毫米,镊合状排列;花盘腺体4,膜质,倒卵形,与萼片互生;雄蕊2,花丝合生;雌花:花梗长约2毫米;萼片6,卵形,全缘,长约1.5毫米;花盘杯状,围绕子房



1—5.尖叶下珠 *Phyllanthus fanchensis* P.T. Li: 1.花枝; 2.雄花; 3.轴柱及萼片; 4.雌花; 5.雌蕊及花盘。6—9.隆脉叶下珠 *P. guangdongensis* P. T. Li: 6.花果枝; 7.雄花; 8.雌花; 9.蒴果。10—14.红叶下珠 *P. ruber* (Lour.) Spreng.: 10.花枝; 11.雄花; 12.轴柱及萼片; 13.雌花; 14.蒴果。

(黄少容绘)