

bodinieri Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 406. 1915.

灌木;枝条淡灰色,有皮孔;小枝具棱翅;全株无毛。叶二列,叶片近革质,卵状披针形,长2—3.5厘米,宽8—12毫米,顶端渐尖,基部宽楔形,边缘干时反卷,上面淡黄绿色,下面淡棕色;中脉两面凸起,侧脉每边4—5条,不明显;叶柄长约1毫米。花雌雄同株,紫红色,多达7朵簇生于小枝两侧叶腋内;雄花:直径约4毫米;花梗纤细,长3—7毫米;萼片4,宽卵形,全缘;花盘腺体4,宽椭圆形,分离,平展,中部内凹;雄蕊2,合生,药室2,横裂;雌花:直径4—4.5毫米,花梗长6—10毫米;萼片6,宽卵形;花盘杯状;子房圆球状,3室,花柱3,顶端2裂。蒴果圆球状,成熟后3瓣裂。

产于贵州东南部和广西东南部。生于山地疏林下。模式标本采自贵州黄果树。

根、叶供药用,槌烂外敷可治跌打损伤。

21. 尖叶下珠(植物分类学报) 图版 29:1—5

Phyllanthus fanchenensis P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 377, fig. 3. 1987.

灌木,高约1米;茎圆柱形,淡褐色;小枝条灰绿色,具翅,有皮孔。叶二列,叶片纸质,披针形,长2—6厘米,宽7—13毫米,基部圆或钝,上面深绿色,下面淡绿色,叶缘干时背卷;侧脉每边3—4条,不很明显;叶柄长1—2毫米;托叶三角形,长约2毫米,褐色,边缘膜质。花淡白色,单朵雄花和2—3朵雌花同簇生于叶腋;雄花:花梗纤细,1—1.5厘米;萼片4,宽卵形,长约2毫米,宽1.7毫米,顶端圆;雄蕊2,花丝合生,花药2室,纵裂;花盘腺体4,肾形或半圆形,全缘,与萼片互生;雌花:花梗长2—2.3厘米;萼片6,2轮,每轮3片,卵形至宽卵形,长2—2.5毫米,宽1.5—2毫米,全缘;花盘盘状,肉质,顶端近全缘,围绕子房基部;子房圆球状,直径约2毫米,3室,每室2颗胚珠,花柱3,分离,顶端2裂至2/3,裂片线形,内弯。蒴果圆球状,直径约5毫米,淡红色,成熟后3瓣裂,轴柱和萼片宿存;果梗长2.3—3厘米。

产于广西东南部,生于海拔206米山谷、河旁灌木丛中。模式标本采自防城十万大山平旺乡双峰山。

22. 落羽松叶下珠(植物分类学报) 滇橄榄(云南潞西)

Phyllanthus taxodiifolius Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 605. 1927; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 325. 1972; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 373. 1987.

灌木,高达2米;枝条四棱形,长达5厘米;全株无毛。叶紧密排成二列,叶片纸质,线状长圆形,长约6毫米,宽1—2毫米,两端钝;侧脉不明显;叶柄极短;托叶披针形,长约2毫米。花雌雄同株,组成团伞花序,生于小枝下部叶腋内;雄花:花梗丝状,长约2毫米;萼片4,倒卵形,长约1毫米,镊合状排列;花盘腺体4,膜质,倒卵形,与萼片互生;雄蕊2,花丝合生;雌花:花梗长约2毫米;萼片6,卵形,全缘,长约1.5毫米;花盘杯状,围绕子房

基部,顶端不规则缺裂;子房卵珠状,花柱 3,顶端 2 裂。蒴果圆球状,直径 4—5 毫米,果皮薄,淡褐色,3 瓣裂;种子三角形,长约 2 毫米,有小乳头状凸起。

产于广西西南部和云南南部,生于山地灌木丛中或疏林下。分布于越南、泰国、柬埔寨。模式标本采自柬埔寨。

23. 蜜甘草(植物分类学报) 飞蛇仔(广东宝安) 图版 25:10—12

Phyllanthus ussuriensis Rupr. et Maxim. in Bull. Phys. Moth. Acad. St. -Pet. Ser. 3, 15: 222. 1856; Ohwi, Fl. Japon new ed. rev. enl. 1454. 1978; Kitagawa, Neo-Lineam. Fl. Manshur. 430. 1979; T. B. Lee, Ill. Fl. Korea 509, fig. 2—35. 1979; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25:378. 1987. —*Phyllanthus simplex* Retz. var. *chinensis* Muell. Arg. in Linnaea 32: 33. 1863, et in DC. Prodr. 15 (2): 391. 1866. —*P. simplex* Retz. var. *ussuriensis* (Rupr. et Maxim.) Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 392. 1866. —*P. matsumurae* Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 20: 11, tab. 1, E. 1904; 中国高等植物图鉴 2: 589, 图 2907. 1972; Chin in Acta Phytotax. Sin. 19:350. 1981. —*P. wilfordii* Croiz. et Metc. in Lingnan Sci. Journ. 20: 194. 1942. —*P. virgatus* Forst. f. var. *chinensis* (Muell. Arg.) Webster in Journ. Japon. Bot. 46(3): 68. 1971. —*P. anceps* auct. non Willd.: Benth. Fl. Hongkong. 311. 1861, p.p.

一年生草本,高达 60 厘米;茎直立,常基部分枝,枝条细长;小枝具棱;全株无毛。叶片纸质,椭圆形至长圆形,长 5—15 毫米,宽 3—6 毫米,顶端急尖至钝,基部近圆,下面白绿色;侧脉每边 5—6 条;叶柄极短或几乎无叶柄;托叶卵状披针形。花雌雄同株,单生或数朵簇生于叶腋;花梗长约 2 毫米,丝状,基部有数枚苞片;雄花:萼片 4,宽卵形;花盘腺体 4,分离,与萼片互生;雄蕊 2,花丝分离,药室纵裂;雌花:萼片 6,长椭圆形,果时反折;花盘腺体 6,长圆形;子房卵圆形,3 室,花柱 3,顶端 2 裂。蒴果扁球状,直径约 2.5 毫米,平滑;果梗短;种子长约 1.2 毫米,黄褐色,具有褐色疣点。花期 4—7 月,果期 7—10 月。

产于黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西等省区,生于山坡或路旁草地。分布于俄罗斯东南部、蒙古、朝鲜和日本。模式标本采自俄罗斯乌苏里地区。

药用,全草有消食止泻作用。

亚属 5. 流萼叶下珠亚属——Subgen. *Eriococcus* (Hassk.) Croiz. et Metc. in Journ. Arn. Arb. 23: 32. 1942; Webster in Journ. Arn. Arb. 38: 359. 1957. —*Eriococcus* Hassk. in Hoeven et Vriese, Tijdschr. 10: 143. 1843.

灌木或半灌木。小枝上的叶呈羽状排列。花雌雄同株;雄花:萼片 4—6,边缘撕裂或流苏状;花盘杯状或分裂成腺体状;雄蕊 2—3,花丝合生,药室通常水平横裂,稀斜裂;