

球状,直径8—8.5毫米,高5—6毫米,被微柔毛;果梗长6—8.5毫米。花期4—6月,果期6—10月。

产于云南(思茅、景东、双江、泸水、勐海、勐腊、景洪等地),生于海拔800—2200米山地林中。分布于印度、泰国、马来西亚和印度尼西亚。模式标本采自印度尼西亚爪哇。

4. **厚叶算盘子** (广州植物志) 丹药良(云南傣语), 赤血仔(台湾), 大云药(广西天等), 朱口沙(广西北流), 出山虎(广西桂平) 图版 42:1—4

Glochidion hirsutum (Roxb.) Voigt, Hort. Suburb. Calcutt. 153. 1845; Muell. Arg. in Linnaea 32: 61. 1863; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 311. 1887; Airy Shaw in Kew Bull. 26(2): 275. 1972; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 26:61. 1988. —*Bradleia hirsuta* Roxb. Fl. Ind. 3: 699. 1832. —*Glochidion dasyphyllum* K. Koch, Hort. Dendr. 85. 1853; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 8: 30. 1926; Croiz. et Hara in Journ. Japon. Not. 16: 317. 1940; 广州植物志 267. 1956; Li, Woody Fl. Taiwan 427. 1963; 海南植物志 2: 124. 1965; 中国高等植物图鉴 2: 584, 图 2897. 1972; Liu, Ligneous Pl. Taiwan 404. 1976; 西藏植物志 3: 64. 1986, non Miq. (1860). —*G. arnottianum* Muell. Arg. in Linnaea 32: 60. 1860. —*Phyllanthus arnottianus* (Muell. Arg.) Muell. Arg. in Flora 48: 370. 1865, et in DC. Prodr. 15(2): 279. 1866. —*P. hirsutus* (Roxb.) Muell. Arg. in Flora 48: 371. 1865, et in DC. Prodr. 15(2): 283. 1866. —*G. zeylanicum* (Gaertn.) A. Juss. var. *tomentosum* Trim. Cat. Ceylon Pl. 79. 1885, et in Fl. Ceylon 4:29. 1898; Hsieh in Li, Fl. Taiwan 3:477. 1977.

灌木或小乔木,高1—8米;小枝密被长柔毛。叶片革质,卵形、长卵形或长圆形,长7—15厘米,宽4—7厘米,顶端钝或急尖,基部浅心形、截形或圆形,两侧偏斜,上面疏被短柔毛,脉上毛被较密,老渐近无毛,下面密被柔毛;侧脉每边6—10条;叶柄长5—7毫米,被柔毛;托叶披针形,长3—4毫米。聚伞花序通常腋上生;总花梗长5—7毫米或短缩;雄花:花梗长6—10毫米;萼片6,长圆形或倒卵形,长3—4毫米,其中3片较宽,外面被柔毛;雄蕊5—8;雌花:花梗长2—3毫米;萼片6,卵形或阔卵形,长约2.5毫米,其中3片较宽,外面被柔毛;子房圆球状,直径约2毫米,被柔毛,5—6室,花柱合生呈近圆锥状,顶端截平。蒴果扁球状,直径8—12毫米,被柔毛,具5—6条纵沟。花果期几乎全年。

产于福建、台湾、广东、海南、广西、云南和西藏等省区,生于海拔120—1800米山地林下或河边、沼地灌木丛中。印度也有。模式标本采自喜马拉雅山东部。

根、叶供药用,有收敛固脱、祛风消肿的功效。根治跌打、风湿、脱肛、子宫下垂、白带、泄泻、肝炎。叶治牙痛等。木材坚硬,可供水轮木用料。

5. **披针叶算盘子**(新拟) 披针叶馒头果(台湾植物志) 图版 43



1—4.厚叶算盘子 *Glochidion hirsutum* (Roxb.) Voigt: 1.果枝; 2.雄花; 3.雌花; 4.蒴果。5—8.艾胶算盘子 *G. lanceolarium* (Roxb.) Voigt: 5.花果枝; 6.雄花; 7.蒴果; 8.轴柱及宿存萼片。9—11.香港算盘子 *G. zeylanicum* (Gaertn.) A. Juss.: 9.花果枝; 10.雄花; 11.蒴果; 12.雌花(黄少容绘)