

灌木,高达5米,小枝密被淡黄色、扩展的长柔毛。叶片纸质,卵形、狭卵形或宽卵形,长4—8厘米,宽1.5—3.5厘米,顶端渐尖或急尖,基部钝、截形或圆形,两面均被长柔毛,下面毛被较密;侧脉每边4—5条;叶柄长1—2毫米,被柔毛;托叶钻状,长3—4毫米。花单生或2—4朵簇生于叶腋内;雌花生于小枝上部,雄花则生于下部;雄花:花梗长4—6毫米;萼片6,长倒卵形,长2.5—4毫米,顶端急尖,外面被疏柔毛;雄蕊3;雌花:几无花梗;萼片6,长圆形,长2.5—3毫米,其中3片较狭,两面均被长柔毛;子房扁球状,密被柔毛,4—5室,花柱合生呈圆柱状,直立,长约1.5毫米,顶端4—5裂。蒴果扁球状,直径8—10毫米,具4—5条纵沟,密被长柔毛,顶端具圆柱状稍伸长的宿存花柱。花果期几乎全年。

产于江苏、福建、台湾、湖南、广东、海南、广西、贵州和云南等省区,生于海拔130—1600米山坡、山谷灌木丛中或林缘。越南也有。模式标本采自香港。

全株或根、叶供药用,有解漆毒,收敛止泻、祛湿止痒的功效。治漆树过敏、剥脱性皮炎、荨麻疹、肠炎、痢疾、脱肛、牙痛、咽喉炎、乳腺炎、白带、月经过多、皮肤湿疹、稻田性皮炎等。

13. 山漆茎(四川)

Glochidion lutescens Bl. Bijdr. 585. 1825; Back. et Bakh. f. Fl. Java 1: 463. 1963; Airy Shaw in Kew Bull. Add. Ser. 4: 126. 1975. — *Anisonema hypoleucum* Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 449. 1861. — *Phyllanthus lutescens* (Bl.) Muell. Arg. in Flora 48:77. 1865, et in DC. Prodr. 15 (2): 296. 1966. — *P. hypoleucus* (Miq.) Muell. Arg. in Flora 48:374. 1865. — *G. breynioides* C. B. Rob. in Pilipp. Journ. Sci. Bot. 4:95. 1909.

乔木,高达10米;枝条细;除叶片下面和蒴果外,全株均无毛。叶片坚纸质至革质,椭圆形、卵状披针形或斜卵形,长6—14厘米,宽3—7厘米,顶端短渐尖至钝、基部急尖、钝至圆,上面绿色,下面灰白色,被微柔毛至无毛;叶柄长3—5毫米。花小,多朵簇生于叶腋内;雄花:花梗长约5毫米;萼片6,椭圆形,长约2毫米;雄蕊3,合生呈圆柱状;雌花:花梗长2—3毫米或几无;萼片6,卵形;子房圆球形,6室,花柱圆柱状或近圆锥状,顶端截平,与子房等长。蒴果扁球状,直径10—18毫米,高约5毫米,淡红色,有6条纵沟,被微柔毛;果梗长1.5—5毫米。

产于广东、四川、贵州和云南等地,生于山地疏林中。分布于亚洲东南部,自印度至印度尼西亚、巴布亚新几内亚。模式标本采自印度尼西亚爪哇。

14. 算盘子(植物名实图考) 红毛馒头果(台湾木本植物志),野南瓜、柿子椒(植物名实图考),狮子滚球(岭南草药志),百家桔(中国土农药志),美省榜(广西侗语),加播该迈(广西苗语),裸杯墨(广西壮语),矮子郎(湖北) 图版 44:5—9,45:1—9

Glochidion puberum (Linn.) Hutch. in Sarg. Pl. Wilson. 2:518. 1916; Hand.