

8—10 条纵沟;花柱宿存;果梗长 3—8 毫米。花期 4—8 月,果期 7—12 月。

产于福建、台湾、广东、海南、广西、四川和云南等省区,生于山地阔叶林中。分布于菲律宾、马来西亚和印度尼西亚等。模式标本采自菲律宾。

19. **圆果算盘子**(中国经济植物志) 山柑树(海南),山柑算盘子(海南植物志),栗叶算盘子(广东药用植物手册) 图版 47:5—9

Glochidion sphaerogynum (Muell. Arg.) Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2: 346. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 317. 1887; Airy Shaw in Kew Bull. 26 (2): 280. 1972; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 26: 63. 1988. — *Phyllanthus sphaerogynus* Muell. Arg. in Flora 48: 375. 1865, et in DC. Prodr. 15 (2): 293. 1866. — *Glochidion jagifolium* Miq. Pl. Hobenack. 1468. (manuscr. ined.) — *P. jagifolius* (Miq.) Muell. Arg. in Flora 48: 373. 1865, et in DC. Prodr. 15 (2): 288. 1866. — *G. jagifolium* Miq. ex Bedd. Forest. Man. Bot. 193. 1872. — *G. jagifolium* (Miq.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 312. 1887; Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 617. 1927; 海南植物志 2:125. 1965.

乔木或灌木,高 4—10 米;树皮灰白色;小枝具棱,无毛。叶片纸质或近革质,卵状披针形,披针形或长圆状披针形,长 7—10 厘米,宽 1.5—3.5 厘米,顶端渐尖,基部急尖,两侧通常略不相等,两面无毛,上面绿色,下面浅绿色,干后灰褐色;侧脉每边 6—8 条;叶柄长 5—8 毫米;托叶近三角形,长 2—3 毫米。花簇生于叶腋内,雌花生于小枝上部,雄花则在下部,或雌花和雄花同生于小枝中部的叶腋内;雄花:花梗长 6—8 毫米;萼片 5—6,倒卵形或椭圆形,长约 2 毫米,淡黄色;雄蕊 3,合生,药隔尖;雌花:花梗长 2—3 毫米;萼片 6,卵形或卵状三角形,外轮 3 片较大而厚,长约 1 毫米;子房 4—6 室,无毛,上部为花柱所包,花柱合生呈扁珠状,宽约 2 毫米,约为子房宽的 2 倍。蒴果扁球状,直径 8—10 毫米,高约 4 毫米,顶端凹陷,边缘有 8—12 条纵沟,顶端具有扁球状的花柱宿存。花期 12 月—翌年 4 月,果期 4—10 月。

产于广东、海南、广西和云南等省区,生于海拔 100—1 600 米山地疏林中或旷野灌木丛中。分布于印度、缅甸、泰国、越南等。模式标本采自印度东部。

树皮含鞣质 14.31%。枝叶供药用,有清热解毒之效,可治感冒发热、暑热口渴、口腔炎等;外治刀伤出血、骨折;外洗治湿疹、疮疡溃烂等。

20. **青背叶算盘子**(植物分类学报) 淡红脉算盘子(植物分类学报) 图版 45:4—6

Glochidion thomsonii (Muell. Arg.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 318. 1887; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 26: 62. 1988. — *Phyllanthus thomsonii* Muell. Arg. in Flora 48: 375. 1865, et in DC. Prodr. 15(2): 293. 1866. — *Glochidion rubidulum* Chin in Acta Phytotax. Sin. 18(2): 251, fig. 1(4—6). 1980; 西藏植物志 3:67, 图 23(3—4). 1986.



1—4. 长柱算盘子 *Glochidion khasicum* (Muell. Arg.) Hook. f.: 1. 果枝; 2. 雄花; 3. 雄蕊; 4. 蒴果。5—9. 圆果算盘子 *G. sphaerogynum* (Muell. Arg.) Kurz: 5. 果枝; 6. 雄花; 7. 雌花; 8. 雌花横切, 示胚珠着生及萼片排列; 9. 蒴果。(黄少容绘)