

15 厘米,宽 3.5—4.5 厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部钝,下面干时淡褐色;侧脉每边 6—8 条;叶柄长 2—3 毫米;托叶三角形,长 2 毫米。多朵雄花与少数几朵雌花同时簇生于叶腋内;雄花:直径约 3 毫米,花梗长 13—20 毫米,纤细,被短柔毛;萼片 6,长圆形或倒卵状长圆形,外面被短柔毛;雄蕊 3,合生,花药长卵形,药隔突尖;雌花:几无梗;萼片与雄花的相同;子房圆球状,3—4 室,初时被短柔毛,后变无毛,花柱合生呈圆锥状,无毛。蒴果扁球状,直径 6—8 毫米,高 2—3 毫米,通常 4 室,果皮薄;果梗短;种子半圆球形,红色。

产于台湾、广东、海南、广西、贵州和云南等省区,生于海拔 130—1700 米山地常绿阔叶林中或河旁灌木丛中。分布于印度、锡金、缅甸、泰国和越南等地。模式标本采自印度阿萨姆。

23. **革叶算盘子**(云南种子植物名录) 达氏算盘子(拉汉种子植物名称),灰叶算盘子(植物分类学报)

Glochidion daltonii (Muell. Arg.) Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2: 344. 1877; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 320. 1887; Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 626. 1927; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 224. 1929; Airy Shaw in Kew Bull. 26 (2): 274. 1972. — *Phyllanthus daltonii* Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 310. 1866.

灌木或乔木,高 3—10 米;枝条具棱,干后褐色;小枝细,开展;除叶柄和子房外,全株均无毛。叶片纸质或近革质,披针形或椭圆形,有时呈镰刀状,长 3—12 厘米,宽 1.5—3 厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部宽楔形,上面灰绿色,下面灰白色;侧脉每边 5—7 条,下面凸起;叶柄长 2—4 毫米,初时被微毛,后变无毛;托叶三角形,长约 1 毫米。花簇生于叶腋内,基部有 2 枚苞片;雌花生于小枝上部,雄花生于小枝下部;雄花:花梗长 5—8 毫米;萼片 6,长圆形或卵状长圆形,长 2.5—3 毫米,宽约 1 毫米,顶端钝;雄蕊 3;雌花:几无花梗;萼片 6,与雄花的相同;子房扁球状,初时被微毛,后变无毛,4—6 室,花柱合生呈明显的棍棒状,顶端 3—6 裂。蒴果扁球状,直径 1—1.5 厘米,干后褐色,具 4—6 条纵沟,基部有宿存的萼片;果梗长约 2 毫米。花期 3—5 月,果期 4—10 月。

产于山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州和云南等省区,生于海拔 200—1700 米山地疏林中或山坡灌木丛中。分布于印度、缅甸、锡金、泰国和越南等地。模式标本采自锡金。

叶、茎皮和幼果均含丰富鞣质,可提制栲胶。

24. **湖北算盘子**(拉汉种子植物名称)

Glochidion wilsonii Hutch. in Sarg. Pl. Wilson. 2: 518. 1916;中国高等植物图鉴 2: 585,图 2900. 1972;湖北植物志 2: 366,图 1266. 1979.

灌木,高 1—4 米;枝条具棱,灰褐色;小枝直而开展;除叶柄外,全株均无毛。叶片纸质,披针形或斜披针形,长 3—10 厘米,宽 1.5—4 厘米,顶端短渐尖或急尖,基部钝或宽楔形,上面绿色,下面带灰白色;中脉两面凸起,侧脉每边 5—6 条,下面凸起;叶柄长 3—5 毫