

米,被极细柔毛或几无毛;托叶卵状披针形,长2—2.5毫米。花绿色,雌雄同株,簇生于叶腋内,雌花生于小枝上部,雄花生于小枝下部;雄花:花梗长约8毫米;萼片6,长圆形或倒卵形,长2.5—3毫米,宽约1毫米,顶端钝,边缘薄膜质;雄蕊3,合生;雌花:花梗短;萼片与雄花的相同;子房圆球状,6—8室,花柱合生呈圆柱状,顶端多裂。蒴果扁球状,直径约1.5厘米,边缘有6—8条纵沟,基部常有宿存的萼片;种子近三棱形,红色,有光泽。花期4—7月,果期6—9月。

产于安徽、浙江、江西、福建、湖北、广西、四川、贵州等省区,生于海拔600—1600米山地灌木丛中。模式标本采自湖北西部。

叶、茎及果含鞣质,可提取栲胶。

25. 倒卵叶算盘子(拉汉种子植物名称) 神子木(植物学大辞典) 图版 48:10—14

*Glochidion obovatum* Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Muench. 4(2): 143. 1843; 孔庆莱等,植物学大辞典 826. 1933; Ohwi, Fl. Japon. new ed. rev. enl. 835. 1978. — *Phyllanthus obovatus* (Sieb. et Zucc.) Muell. Arg. in Flora 48: 387. 1865, et in DC. Prodr. 15(2): 307. 1866; non Muhl. ex Willd. (1805).

灌木或小灌木;枝条被短柔毛。叶片倒卵形或长圆状倒卵形,长3.5—8厘米,宽2—2.5厘米,顶端钝或短渐尖,基部楔形,干后棕色,无毛;叶柄长1.5—2毫米;托叶卵状三角形。聚伞花序生于叶腋;雄花:花梗长6—9毫米;萼片6,倒卵形,长1.5—2毫米;雄蕊3,合生;雌花:花梗长3—6毫米;萼片与雄花的相同;子房卵形,4—6室,无毛,花柱合生呈圆柱状,顶端6裂。蒴果扁球状,直径约7毫米,高约4.5毫米,具8—12条纵沟。

产于浙江、福建、台湾、生于山地灌木丛中。日本也有。模式标本采自日本。

26. 水社算盘子(拉汉种子植物名称)

*Glochidion suishaense* Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 97. 1920; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 347. 1936.

灌木;小枝纤细;全株无毛。叶片薄革质,卵形、倒卵形至长圆形,长4.5—8.5厘米,宽3—4.5厘米,顶端急尖,基部楔形、钝或圆;叶柄长约3毫米。雌花和雄花同簇生于叶腋内;雄花:花梗纤细;萼片6,倒卵形,2轮,外轮较大,长约3毫米,宽1.5毫米,顶端极钝,内轮的较小,长约2.5毫米,宽约1毫米;雄蕊3,合生;雌花:花梗长1—1.5毫米;萼片6,长圆形,2轮,外轮的较大,长约2毫米,宽1.5毫米,顶端钝,具有不明显的小齿或全缘,内轮的较小而狭,长2毫米,宽0.6毫米,边缘具小齿或全缘;子房扁球状,直径约1毫米,高0.6毫米,花柱倒圆锥形,顶端多裂。蒴果扁球状,直径约1.5厘米,高8毫米,边缘有8条纵沟;种子红色。

产于台湾,生于低海拔山地灌木丛中。模式标本采自水社。

27. 长柱算盘子(新拟) 图版 47:1—4

*Glochidion khasicum* (Muell. Arg.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 324. 1887; Airy