

米,被极细柔毛或几无毛;托叶卵状披针形,长2—2.5毫米。花绿色,雌雄同株,簇生于叶腋内,雌花生于小枝上部,雄花生于小枝下部;雄花:花梗长约8毫米;萼片6,长圆形或倒卵形,长2.5—3毫米,宽约1毫米,顶端钝,边缘薄膜质;雄蕊3,合生;雌花:花梗短;萼片与雄花的相同;子房圆球状,6—8室,花柱合生呈圆柱状,顶端多裂。蒴果扁球状,直径约1.5厘米,边缘有6—8条纵沟,基部常有宿存的萼片;种子近三棱形,红色,有光泽。花期4—7月,果期6—9月。

产于安徽、浙江、江西、福建、湖北、广西、四川、贵州等省区,生于海拔600—1600米山地灌木丛中。模式标本采自湖北西部。

叶、茎及果含鞣质,可提取栲胶。

25. 倒卵叶算盘子(拉汉种子植物名称) 神子木(植物学大辞典) 图版 48:10—14

Glochidion obovatum Sieb. et Zucc. in Abh. Akad. Muench. 4(2): 143. 1843; 孔庆莱等,植物学大辞典 826. 1933; Ohwi, Fl. Japon. new ed. rev. enl. 835. 1978. — *Phyllanthus obovatus* (Sieb. et Zucc.) Muell. Arg. in Flora 48: 387. 1865, et in DC. Prodr. 15(2): 307. 1866; non Muhl. ex Willd. (1805).

灌木或小灌木;枝条被短柔毛。叶片倒卵形或长圆状倒卵形,长3.5—8厘米,宽2—2.5厘米,顶端钝或短渐尖,基部楔形,干后棕色,无毛;叶柄长1.5—2毫米;托叶卵状三角形。聚伞花序生于叶腋;雄花:花梗长6—9毫米;萼片6,倒卵形,长1.5—2毫米;雄蕊3,合生;雌花:花梗长3—6毫米;萼片与雄花的相同;子房卵形,4—6室,无毛,花柱合生呈圆柱状,顶端6裂。蒴果扁球状,直径约7毫米,高约4.5毫米,具8—12条纵沟。

产于浙江、福建、台湾、生于山地灌木丛中。日本也有。模式标本采自日本。

26. 水社算盘子(拉汉种子植物名称)

Glochidion suishaense Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 97. 1920; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 347. 1936.

灌木;小枝纤细;全株无毛。叶片薄革质,卵形、倒卵形至长圆形,长4.5—8.5厘米,宽3—4.5厘米,顶端急尖,基部楔形、钝或圆;叶柄长约3毫米。雌花和雄花同簇生于叶腋内;雄花:花梗纤细;萼片6,倒卵形,2轮,外轮较大,长约3毫米,宽1.5毫米,顶端极钝,内轮的较小,长约2.5毫米,宽约1毫米;雄蕊3,合生;雌花:花梗长1—1.5毫米;萼片6,长圆形,2轮,外轮的较大,长约2毫米,宽1.5毫米,顶端钝,具有不明显的小齿或全缘,内轮的较小而狭,长2毫米,宽0.6毫米,边缘具小齿或全缘;子房扁球状,直径约1毫米,高0.6毫米,花柱倒圆锥形,顶端多裂。蒴果扁球状,直径约1.5厘米,高8毫米,边缘有8条纵沟;种子红色。

产于台湾,生于低海拔山地灌木丛中。模式标本采自水社。

27. 长柱算盘子(新拟) 图版 47:1—4

Glochidion khasicum (Muell. Arg.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 324. 1887; Airy

Shaw in Kew Bull. **26** (2): 277. 1972. — *Phyllanthus khasicus* Muell. Arg. in Flora **48**: 389. 1865, et in DC. Prodr. **15** (2): 311. 1866.

灌木或小乔木;小枝具棱;全株均无毛。叶片革质,长圆形或卵状披针形,长7—10厘米,宽2.5—4厘米,顶端渐尖,基部急尖并下延至叶柄,干后淡绿色;侧脉每边5—6条;叶柄粗壮,长4—6毫米;托叶卵状三角形,长2.5毫米。花数朵簇生于叶腋内;雄花:花梗短;萼片6,倒披针形,不等大,长3—3.5毫米;雄蕊3,合生,药隔突起;雌花:几无花梗;萼片6,卵状长圆形,不等大,长3.5—4毫米;子房圆球状,3室,花柱合生呈伸长、粗而近棍棒状,顶端不等的3齿裂。蒴果扁球状,顶部和基部凹陷,直径约8毫米,具3纵沟;种子半球形;果梗短。

产于广西和云南,生于海拔900—1300米山地疏林中或山谷灌木丛中。分布于印度、锡金、泰国等。模式标本采自印度东部卡西亚。

28. 茎花算盘子(新拟) 劳莫(斐济土语) 图版 39: 5—10

Glochidion ramiflorum J. R. et G. Forst. Charact. Gen. Pl. 114, tab. 57. 1776. — *Phyllanthus ramiflorus* (J. R. et G. Forst.) Muell. Arg. in Flora **48**: 374. 1865, et in DC. Prodr. **15** (2): 289. 1866.

灌木或小乔木,高1—6米;枝条灰色,质脆,嫩梢绿色,新梢下段常呈淡紫色。叶片纸质,长圆形、椭圆形至长卵形,长10—15厘米,宽4—5厘米,顶端尾状渐尖,基部钝,上面深绿色,下面绿色,干时呈褐黑色,两面无毛;中脉两面均凸起,侧脉每边6—9条;叶柄长4—5毫米,无毛;托叶宽三角形,中肋突起。花4—9朵簇生于叶腋内,花梗长4—6毫米,雌花生于树冠上层枝上部,雄花常生于树冠下层枝上,有时雌花和雄花同生于小枝上;雄花:萼片6,2轮,宽卵形,长约2毫米,宽约1.2毫米,淡黄色,无毛;雄蕊3,合生呈圆柱状,药室2,纵裂;雌花:萼片与雄花的相似,但较小,长约1毫米,宽约0.7毫米;子房卵圆形,5—6室,无毛,每室有胚珠2。蒴果近圆球状,直径约6毫米。花期4—6月和8—12月,果期7月—翌年2月。

广东中部地区栽培,适生于温暖气候,土层深厚、肥沃、湿润、排水良好的立地环境。原产于斐济塔维乌尼岛。

药用,原产地人们,常用其叶来作避孕药。

16. 守宫木属*——Sauropus Bl.

Bl. Bijdr. 595. 1825; Endl. Gen. 1119. 1840; Muell. Arg. in DC. Prodr. **15** (2): 239. 1866; Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl.

* 守宫木属(植物学名词审查本),别名:梭罗巴属(广州植物志)。



1—4. 长柱算盘子 *Glochidion khasicum* (Muell. Arg.) Hook. f.: 1. 果枝; 2. 雄花; 3. 雄蕊; 4. 蒴果。5—9. 圆果算盘子 *G. sphaerogynum* (Muell. Arg.) Kurz: 5. 果枝; 6. 雄花; 7. 雌花; 8. 雌花横切, 示胚珠着生及萼片排列; 9. 蒴果。(黄少容绘)