

Shaw in Kew Bull. **26** (2): 277. 1972. — *Phyllanthus khasicus* Muell. Arg. in Flora **48**: 389. 1865, et in DC. Prodr. **15** (2): 311. 1866.

灌木或小乔木;小枝具棱;全株均无毛。叶片革质,长圆形或卵状披针形,长7—10厘米,宽2.5—4厘米,顶端渐尖,基部急尖并下延至叶柄,干后淡绿色;侧脉每边5—6条;叶柄粗壮,长4—6毫米;托叶卵状三角形,长2.5毫米。花数朵簇生于叶腋内;雄花:花梗短;萼片6,倒披针形,不等大,长3—3.5毫米;雄蕊3,合生,药隔突起;雌花:几无花梗;萼片6,卵状长圆形,不等大,长3.5—4毫米;子房圆球状,3室,花柱合生呈伸长、粗而近棍棒状,顶端不等的3齿裂。蒴果扁球状,顶部和基部凹陷,直径约8毫米,具3纵沟;种子半球形;果梗短。

产于广西和云南,生于海拔900—1300米山地疏林中或山谷灌木丛中。分布于印度、锡金、泰国等。模式标本采自印度东部卡西亚。

28. 茎花算盘子(新拟) 劳莫(斐济土语) 图版 39: 5—10

Glochidion ramiflorum J. R. et G. Forst. Charact. Gen. Pl. 114, tab. 57. 1776. — *Phyllanthus ramiflorus* (J. R. et G. Forst.) Muell. Arg. in Flora **48**: 374. 1865, et in DC. Prodr. **15** (2): 289. 1866.

灌木或小乔木,高1—6米;枝条灰色,质脆,嫩梢绿色,新梢下段常呈淡紫色。叶片纸质,长圆形、椭圆形至长卵形,长10—15厘米,宽4—5厘米,顶端尾状渐尖,基部钝,上面深绿色,下面绿色,干时呈褐黑色,两面无毛;中脉两面均凸起,侧脉每边6—9条;叶柄长4—5毫米,无毛;托叶宽三角形,中肋突起。花4—9朵簇生于叶腋内,花梗长4—6毫米,雌花生于树冠上层枝上部,雄花常生于树冠下层枝上,有时雌花和雄花同生于小枝上;雄花:萼片6,2轮,宽卵形,长约2毫米,宽约1.2毫米,淡黄色,无毛;雄蕊3,合生呈圆柱状,药室2,纵裂;雌花:萼片与雄花的相似,但较小,长约1毫米,宽约0.7毫米;子房卵圆形,5—6室,无毛,每室有胚珠2。蒴果近圆球状,直径约6毫米。花期4—6月和8—12月,果期7月—翌年2月。

广东中部地区栽培,适生于温暖气候,土层深厚、肥沃、湿润、排水良好的立地环境。原产于斐济塔维乌尼岛。

药用,原产地人们,常用其叶来作避孕药。

16. 守宫木属*——*Sauropus* Bl.

Bl. Bijdr. 595. 1825; Endl. Gen. 1119. 1840; Muell. Arg. in DC. Prodr. **15** (2): 239. 1866; Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl.

* 守宫木属(植物学名词审查本),别名:梭罗巴属(广州植物志)。



1—4. 白背算盘子 *Glochidion wrightii* Benth.: 1. 果枝; 2—3. 雄花; 4. 蒴果。5—10. 茎花算盘子 *G. ramiflorum* J. R. et G. Forst.: 5. 花枝; 6. 雄花; 7. 合生雄蕊; 8. 雄蕊; 9. 雌花; 10. 蒴果; 11—13. 红算盘子 *G. coccineum* (Buch.-Ham.) Muell. Arg.: 11. 花果枝; 12. 雄花; 13. 雌花。

(黄少容绘)