

nud. — *Aralius trinervius* Kuntze, Rev. 591. 1891.

灌木,高1—4米;枝条具棱;除幼枝被腺毛外,全株均无毛。叶片卵形或卵状披针形,长4—12.5厘米,宽2—3.5厘米,顶端急尖,基部钝或圆;基出脉3,侧脉每边4—6条,纤细;叶柄长约3毫米;托叶披针形,长约5—8毫米。雄花组成腋生总状花序;花序梗短,基部着生有许多苞片;雄花:花梗纤细,长7—10毫米;花萼直径约5毫米,6裂至中部,裂片卵状三角形,长约4毫米,反折;花盘腺体2轮,外轮比内轮短,顶端钝,内轮的长而窄;雄蕊3,花柱合生呈短柱状;雌花:花梗长约7毫米,单生叶腋内;花萼直径4—6毫米,6裂,裂片倒卵形,2轮,常不等大,外轮比内轮长2倍;子房长卵形,顶端截形,花柱短。蒴果圆球状,直径约2.5厘米,外果皮薄,骨质,6片裂。

产于云南会泽、开远等地,生于海拔1000—1300米山地疏林下或山谷灌木丛中。分布于印度和锡金等。模式标本采自锡金。

2. 波萼守宫木(植物分类学报) 图版 49: 5—7

Sauropus repandus Muell. Arg. in Flora 65:2. 1872; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5:334. 1887; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81 (IV. 147. XV): 220. 1921; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 132. 1987.

灌木,高达1米;茎圆柱状,棕褐色;枝条具棱凸,灰黄色;除幼枝被微柔毛外,全株均无毛。叶片膜质,卵形、椭圆形或卵状披针形,长3—9厘米,宽1.5—3厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部宽楔形、钝至圆,上面深绿色,下面淡绿色;基出脉3条,中脉两面稍凸起,侧脉每边3—5条;叶柄长约3毫米;托叶披针形,长2—3毫米。花雌雄同株,簇生于叶腋;雄花:花梗丝状,长5—6毫米;花萼盘状,直径5—6毫米,淡黄绿色,边缘浅波状;花盘腺体6,倒心形,扁平,膜质,顶端凹陷,贴生于花萼上;雄蕊3,花丝合生呈短柱状;雌花:花梗丝状,长6—13毫米;花萼直径7—9毫米,6裂至基部,裂片2轮,外轮的宽卵形,顶端钝,内轮的比外轮的短,近圆形;子房陀螺状,顶端截形,花柱3,顶端2裂,裂片下弯。花期9月。

产于云南勐海,生于海拔800—1300米山地疏林下。分布于锡金。模式标本采自锡金。

3. 龙脷叶(岭南采药录) 龙舌叶(广东湛江),龙味叶(广东清远) 图版 50: 1—3

Sauropus spatulifolius Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5: 652. 1927; Airy Shaw in Kew Bull. 33(3):530. 1979; P. T. Li in Journ. South China Agr. Coll. 2 (1):42. 1981, et in Acta Phytotax. Sin. 25:132. 1987. — *Sauropus changianus* S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 32: 393, Pl. 1. 1951. — *S. rostratus* auct. non Miq.: How, Fl. Guangzhou 269, fig. 134. 1956.

常绿小灌木,高10—40厘米;茎粗糙;枝条圆柱状,直径2—5毫米,蜿蜒状弯曲,多皱纹;幼时被腺状短柔毛,老渐无毛,节间短,长2—20毫米。叶通常聚生于小枝上部,常向



1—4. 苍叶守宫木 *Sauropus garrettii* Craib: 1. 雌花枝; 2. 雄花; 3. 雌花; 4. 子房横切面, 示胚珠着生。5—7. 波萼守宫木 *S. repandus* Muell. Arg. 5. 雄花枝; 6. 雄花蕾; 7. 雄花。8—11. 守宫木 *S. androgynus* (Linn.) Merr. 8. 花枝; 9. 雄花; 10. 雌花; 11. 蒴果。(黄少容绘)