

下弯垂,叶片鲜时近肉质,干后近革质或厚纸质,匙形、倒卵状长圆形或卵形,有时长圆形,长 4.5—16.5 厘米,宽 2.5—6.3 厘米,顶端浑圆或钝,有小凸尖,稀凹缺,基部楔形或钝,稀圆形,上面鲜时深绿色,叶脉处呈灰白色,干时黄白色,通常无毛,有时下面基部有腺状短柔毛,后变无毛;中脉和侧脉在鲜叶时扁平,干后中脉两面均凸起,侧脉每边 6—9 条,下面稍凸起;叶柄长 2—5 毫米,初时被腺状短柔毛,老渐无毛;托叶三角状耳形,着生于叶柄基部两侧,长 4—8 毫米,基部宽 3—4 毫米,宿存。花红色或紫红色,雌雄同枝,2—5 朵簇生于落叶的枝条中部或下部,或茎花,有时组成短聚伞花序,花序长达 15 毫米;花序梗短而粗壮,着生有许多披针形的苞片;苞片长约 2 毫米;雄花:花梗丝状,长 3—5 毫米;萼片 6,2 轮,近等大,倒卵形,长 2—3 毫米,宽约 1.5 毫米;花盘腺体 6,与萼片对生;雄蕊 3,花丝合生呈短柱状;雌花:花梗长约 2—3 毫米;萼片与雄花的相同;无花盘;子房近圆球状,直径约 1 毫米,3 室,花柱 3,顶端 2 裂。花期 2—10 月。

福建、广东、广西等栽培于药圃、公园、村边及屋旁。原产于越南北部,马来半岛有栽培。模式标本采自越南河内。

叶可药用,可治咳嗽、喉痛、急性支气管炎等。

4. 茎花守宫木(广西植物) 图版 50: 4—9

Sauropus bonii Beille in Lec. Fl. Gén. Indo-Chiné 5:651. 1927; Airy Shaw in Kew Bull. 26(2):334. 1972; P. T. Li in Guihaia 3(3):168. 1983, et in Acta Phytotax. Sin. 25:133. 1987.

灌木,高达 3 米;茎皮灰色;枝条具棱,绿色;全株无毛。叶片纸质,长椭圆形、卵状披针形或倒披针形,长 7—14 厘米,宽 2.5—5 厘米,顶端渐尖或短渐尖,基部宽楔形,上面深绿色,下面淡绿色;侧脉每边 7—11 条,斜升至叶缘前弯曲连结;叶柄长 3—6 毫米;托叶三角形,长 3—5 毫米,着生于叶柄基部两侧。总状聚伞花序着生于茎的下部或基部,长 6—15 厘米,常下垂,雌雄同序;花序梗和花梗的基部均分别有覆瓦状排列的苞片和小苞片;雄花:花梗丝状,长 2—4 毫米;花萼杯状,边缘波状,直径 3—5 毫米,膜质,淡黄色,有红色斑纹;花盘 6 浅裂,贴生于花萼上;雄蕊 3,合生呈柱状,花药长圆形;雌花:花梗长 2—3 毫米;花萼钟状,直径 3—5 毫米,6 裂,裂片匙形或倒卵形,2 轮,外轮的长 3—5 毫米,内轮的长 2—4 毫米;子房卵圆形或圆球形,3 室,每室 2 颗胚珠,花柱 3,分离,顶端 2 裂,裂片向下弯。蒴果近圆球状,直径约 2 厘米,高约 1.5 厘米,6 月裂。

产于广西龙州和天峨等地,生于海拔 200—500 米石灰岩山地林下或山坡灌木丛中。分布于越南和泰国。模式标本采自越南河内。

5. 网脉守宫木(植物分类学报) 图版 51: 1—2

Sauropus reticulatus X. L. Mo ex P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 133. 1987.

灌木,高约 2 米,全株无毛。叶片革质,长圆形、长椭圆形或椭圆状披针形,长 10—16



1—2.网脉守宫木 *Sauropus reticulatus* X. L. Mo ex P. T. Li: 1.果枝; 2.蒴果。3.多脉守宫木 *S. yashuiianus* P. T. Li: 雌花枝。4.长梗守宫木 *S. macranthus* Hassk.: 4.果枝。(黄少容绘)

厘米,宽 4—5 厘米,顶端渐尖,基部宽楔形至钝;侧脉每边 8—10 条,与网脉两面均明显,且微凸起;叶柄长约 5 毫米;托叶三角形,常早落。蒴果扁球状,直径约 2 厘米,高约 1.5 厘米,单生于叶腋;果梗长约 3 厘米;宿存萼片 6,宽倒卵形,长约 5 毫米,宽 2.5 毫米,较厚,宿存的花柱 3,分离,顶端 2 裂。

产于广西靖西和云南泸西等地,生于海拔 500—800 米石灰岩山地疏林下或山坡灌木丛中。模式标本采自广西靖西。

6. 长梗守宫木(海南植物志) 图版 51: 4

Sauropus macranthus Hassk. *Retzia* 1: 166. 1855, et Hort. Bog. S. Retziae ed. nova 52. 1858; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15(2): 240. 1866; Back. et Bakh. f. Fl. Java 1: 471. 1963; Airy Shaw in Dansk Bot. Arkiv 25(2): 34, fig. 13. 1967, in Kew Bull. 26(2): 336. 1972, et 35(3): 681. 1980, et in Kew Bull. Add. Ser. 4: 193. 1975; Whitmore, Tree Fl. Malaya 2: 131. 1973; P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 133. 1987; non Villar (1877). —*Sauropus spectabilis* Miq. Fl. Ind. Bat. Suppl. 446. 1861. —*S. macrophyllus* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 333. 1887, pro parte; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81(IV. 147. XV): 226. 1921, pro parte. —*S. grandifolius* Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 81(IV. 147. XV): 220. 1921. —*S. longipedicellatus* Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 34. 1934; 海南植物志 2: 136, fig. 362. 1965.

灌木,高 3—4 米;小枝略具棱;全株无毛。叶片纸质,卵状长圆形、卵状椭圆形或椭圆状披针形,长 4—20 厘米,宽 3.5—8 厘米,顶端短渐尖,基部楔形至圆;侧脉每边 6—10 条,近扁平;叶柄长 2.5—7 毫米;托叶三角状披针形,长 3—6 毫米,灰褐色。雌雄同株;雄花:花梗长 2—6.5 毫米;花萼盘状,直径 3.5—4.5 毫米,有红色线斑,顶端浅 6—8 裂;花盘腺体 6—8,与萼片对生;雌花:单生或几朵与雄花簇生于叶腋内;花梗长 2—6 厘米,结果时长 9—13 厘米;花萼黄绿色,6 深裂,裂片稍厚,组成 2 轮,外轮的倒卵形或近匙形,卵状椭圆形,长 6—7 毫米,宽 3—4 毫米,内轮的较短,倒卵形,长约 5 毫米,具紫红色条纹;无花盘;雌蕊扁球状,高 2 毫米,宽 2.7 毫米,子房 3 室,花柱 3,顶端 2 裂。蒴果近球状或扁球状,直径 1.5—2.5 厘米,高约 1.5 厘米,红色或红棕色;宿存萼片倒卵形,具爪,长约 1 厘米;花柱宿存。

产于广东、海南和云南(思茅、西双版纳、金屏等地),生于海拔 500—1500 米山地阔叶林下或山谷灌木丛中。分布自印度东北部,经过亚洲东南部、马来西亚至澳大利亚的北部。模式标本采自印度尼西亚的爪哇。

7. 多脉守宫木(植物分类学报) 图版 51: 3

Sauropus yanhuianus P. T. Li in Acta Phytotax. Sin. 25: 134. 1987.

灌木,高约 1.5 米;枝条具棱,灰青色;全株无毛。叶片薄纸质,长圆形或长圆状披针