

产于广东和海南。生于海拔 200—1 000 米山坡灌丛或山谷疏林中或林缘。分布于亚州东南部各国。模式标本采自印度尼西亚。

植物体含有零陵香油，可作为提取香精的原料。

7. 圆叶野桐 (植物分类学报) 图版 6: 6—9

Mallotus roxburghianus Muell. Arg. in Linnaea **34**: 186. 1865, et in DC. Prodr. **15** (2): 962. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 428. 1887; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (IV. 147. VII): 173. 1914; S. M. Hwang in Acta Phytotax. Sin. **23**: 301. 1985. — *Rottlera peltata* Roxb. Fl. Ind. **3**: 828. 1832 (non *Mallotus peltatus* Muell. Arg. 1865).

小乔木或灌木，植物体干后有零陵香味；嫩枝密被黄色星状毛或单生长柔毛。叶互生，生于小枝上部的有时对生，纸质，卵圆形或卵状三角形，长 8—20 厘米，宽 7—18 厘米，顶端急渐尖或尾状渐尖，基部近截平或稍心形，边缘波状或具疏齿，齿端常具角质突出，上面被糙伏毛和疏生橙黄色颗粒状腺体；掌状脉 7—9 条，侧脉 4—5 对，基部有长圆形褐色斑状腺体 2—4 个；叶柄离叶基部 1—2 厘米处盾状着生，长 5—12 厘米，被黄色星状毛或柔毛；托叶线形，长约 7 毫米，被白色长柔毛。花雌雄异株，雄花序总状，顶生，长 4—13 厘米，下部有时有分枝，密被长柔毛；苞片线形，长约 5 毫米，被长柔毛，每苞腋内有雄花 3—5 朵；雄花：花梗长 2—2.5 毫米；花萼裂片 4，长圆形，长约 2 毫米，顶端尖，花后外折，被长柔毛和颗粒状腺体；雄蕊 25—35 枚，药隔宽；雌花序总状，顶生，长 10—20 厘米，苞片披针形，长 3—5 毫米，苞腋有雌花 1 朵；雌花：花梗长约 2 毫米，花萼佛焰苞状，宿存，最后裂开成 6 片，裂片披针形，长约 3 毫米，外面被长柔毛；子房球形，密被毛和软刺；花柱长 1.5—2 毫米，中部以下合生，柱头长约 2.5 毫米，密生羽毛状突起。蒴果长约 7 毫米，直径约 12 毫米，密被长柔毛和软刺；种子近球形，直径约 4.5 毫米，灰褐色。花期 5—6 月，果期 8—12 月。

产于云南（沧源、盈江、勐海）。生于海拔 300—1 300 米山谷林中。分布于印度、锡金。模式标本采自印度。


组 4. 刺果野桐组 Sect. *Rottleropsis* Muell. Arg. in DC. Prodr. **15** (2): 957. 1866; Airy Shaw in Kew Bull. **21**: 379. 1968. — *Mallotus* Sect. *Echinocroton* (F. Muell.) Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (IV. 147. VII): 148. 1914. — *Mallotus* Sect. *Plagianthera* (Reichb. f. et Zoll.) Pax et Hoffm. l. c. 156.

叶对生，同对的叶形状和大小稍不同，具掌状脉或基出脉，叶基非盾状，下面具颗粒状腺体；雄蕊 30—120 枚，药隔宽。蒴果具软刺，花柱短，中部以下合生，花萼宿存。

模式种：刺果野桐 *Mallotus lappaceus* Muell. Arg.

我国产 3 种。

8. 椴叶野桐 (台湾植物志) 图版 7: 1—2



图版 6 1—3. 粉叶野桐 *Mallotus garrettii* Airy Shaw; 1. 叶; 2. 叶下面 (具颗粒状腺体); 3. 果。
 4—6. 山苦茶 *M. oblongifolius* (Miq.) Muell. Arg.; 4. 叶; 5. 雌花; 6. 果。7—10. 圆叶野桐 *M. roxburghianus* Muell. Arg.; 7. 花枝; 8. 雄花; 9. 雄蕊; 10. 果。(余汉平绘)