

产于云南(西双版纳、孟连)。生于海拔 1 400—1 600 米密林中。模式标本采自西双版纳。

组 6. 野桐组 Sect. *Mallotus*

Mallotus Sect. *Eumallotus* Muell. Arg. in *Linnaea* **34**: 186. 1865, et in DC. *Prodr.* **15** (2): 961. 1866, ex parte; Pax in Engl. u. Prantl, *Pflanzenfam.* **3** (5): 54. 1890, ex parte. — *Mallotus* Sect. *Echinus* (Lour.) Pax et Hoffm. in Engl. *Pflanzenr.* **63** (N. 147. VII): 162. 1914. — *Echinus* Lour. *Fl. Cochinch.* 633. 1790.

叶互生,下面具颗粒状腺体,掌状脉或具基出脉,基部盾状或非盾状着生;雄蕊 45—100 枚,药隔通常宽;雌花的花萼宿存;花柱离生或基部彼此合生;蒴果具软刺。

模式种:白楸 *Mallotus paniculatus* (Lam.) Muell. Arg.

我国产 11 种。

15. 南平野桐 (新拟)

Mallotus dunnii Metc. in *Journ. Arn. Arb.* **22**: 205. 1941. — *M. roxburghianus* Muell. Arg. var. *glabra* Dunn in *Journ. Linn. Soc. Bot.* **38**: 365. 1908; Pax et Hoffm. in Engl. *Pflanzenr.* **63** (N. 147. VII): 173. 1914, *in nota* (pro var. *glabra* Dunn); Croiz. in *Journ. Arn. Arb.* **19**: 144. 1938.

灌木,高 1—4 米;小枝红褐色,疏生星状毛或长柔毛,毛很快脱落。叶互生,有时生于小枝顶部的近对生,薄纸质,卵状三角形或近圆形,长 10—25 厘米,宽 8—21 厘米,顶端长渐尖,基部圆形,稀心形,边缘具锯齿,有时上部 2 浅裂,两面均疏生白色长柔毛和散生橙黄色颗粒状腺体,叶脉上被星状毛;掌状脉 8—10 条,侧脉 4—5 对;基部有褐色斑状腺体 2—4 个;叶柄离叶基部 5—30 毫米处盾状着生,长 10—15 厘米,疏生白色长柔毛。花雌雄异株,总状花序或圆锥花序,顶生,疏生白色长柔毛或无毛;雄花序长 10—25 厘米;苞片披针形,长 5—10 毫米,苞腋有雄花 3—8 朵;雄花:花梗长约 5 毫米;花蕾球形或阔卵形;花萼裂片 4—5,卵形,长约 2 毫米,急尖,近无毛;雄蕊 40—50 枚,药隔稍宽;雌花序长 8—35 厘米,疏生白色长柔毛;苞片披针形,长约 1.2 厘米,被黄色星状长柔毛;雌花:花梗细长,长 3—5 厘米,无毛;花萼裂片 4—5,卵状披针形,长约 2.5 毫米,顶端长渐尖,疏生长柔毛;花柱 3,长达 8 毫米,柱头密生羽毛状突起。蒴果钝三棱状球形,具 3 纵槽,直径 6—8 毫米,疏生长 3—4 毫米钻形软刺,密生淡黄色颗粒状腺体;种子椭圆形,灰黑色,平滑。花期 6—7 月,果期 9—10 月。

产于广西、广东、湖南和福建。生于海拔 300—500 米湿润疏林中。模式标本采自福建南平。

16. 四果野桐 (云南林学院学报) 图版 9: 1—2

Mallotus tetracoccus (Roxb.). Kurz, *For. Fl. Brit. Burma* **2**: 382. 1877; Alston in *Trimen, Handb. Fl. Ceylon* **6**: 267. 1931; Croiz. in *Journ. Arn. Arb.* **21**: 503. 1940;