

甸和不丹。模式标本采自印度。

存疑种

1. 樟叶野桐 (西南林学院学报)

Mallotus pallidus (Airy Shaw) Airy Shaw in Kew Bull. **32**: 78. 1977; H. X. Qiu in Journ. Southwest For. Coll. **13**: 74. 1993.

乔木。叶长圆状披针形，下面被灰色微星状绒毛及散生颗粒状腺体。果序不分枝，长6—14厘米。蒴果直径1.3厘米，密被黄色颗粒状腺体。

产于云南南部石灰岩地区密林中。

泰国也有。

未见雄花及雌花。暂作存疑。

2. 尼泊尔野桐 (西藏植物志)

Mallotus nepalensis Muell. Arg. in Linnaea **34**: 188. 1865; Airy Shaw in Kew Bull. **21**: 387. 1968; T. L. Chin in Fl. Xizang. **3**: 78. 1986.

《西藏植物志》记载的分布于喜马拉雅山南坡的本种标本，其嫩枝被黄褐色星状毛，果序长达22厘米，不分枝；果密被黄褐色星状毛，软刺柔软。

未采到雄花及雌花标本，暂作存疑。

3. 肾叶野桐 (新拟)

Mallotus oreophilus Muell. Arg. subsp. **latifolius** Boufford et T. S. Ying in Journ. Arn. Arb. **71**: 575. 1990, *cum fig.*

据原始记载：产于四川的小乔木。叶近肾形或扁圆形，长6—14厘米，宽6.5—20厘米，嫩叶密被星状短绒毛。雌花序不分枝，雌花和果均被星状短绒毛。未见雄花及模式标本，暂作存疑。

24. 墨鳞属* **Melanolepis** Reichb. f. et Zoll.

Reichb. f. et Zoll. in Verh. Naturk. Ver. Nederl. Ind. **1**: 22.

* 虫屎属 (台湾植物志)。