

脉9条，侧脉6对；叶柄长10—14厘米；托叶三角状卵形，长6—10毫米，宽6毫米，无毛或仅顶端被疏毛，脱落。雄花序圆锥状，长11—20厘米，小花序轴呈之字形，被微柔毛，苞片线形，长3—6毫米，近顶部具1个盘状腺体，或呈鳞片状，无腺体，苞腋具多朵花集成的团伞花序；雄花：萼片3枚，卵形，长约1毫米，无毛；雄蕊5—7枚，花药4室；花梗长1毫米，被疏柔毛。雌花序圆锥状，长5—7厘米；苞片线形，长2—6毫米，具盘状腺体1—3个，小花序轴上的苞片小，无腺体；雌花：萼片4枚，三角形，长1.5毫米，被疏毛，宿存；子房2室，花柱2枚，长约2毫米，扁平，具乳头状突起。蒴果双球形，长4毫米，宽7—8毫米，具颗粒状腺体；果梗长约8毫米。花期5—7月，果期7—10月。

产于广东中部和西部、广西、贵州西南部、云南东南部。生于海拔300—1300米山谷常绿阔叶林或疏林中。分布于越南北部。模式标本采自越南。

本种与印度血桐近似，但小枝和成长叶下面呈粉绿色，无毛，子房2室，花柱2枚，扁平。

4. 台湾血桐 (广西植物) 红肉橙兰 (台湾植物志)

Macaranga sinensis (Baill.) Muell. Arg. in DC. Prodr. **15** (2): 1001. 1866; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 443. 1894; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (N. 147. VII): 351. 1914; Li, Woody Fl. Taiwan 431, f. 166. 1963. C. F. Hsieh in Fl. Taiwan **3**: 480, pl. 694. 1977; H. S. Kiu in Guihaia **2**: 148. 1982, in clavi. — *Mappa sinensis* Baill. Etud. Gén. Euphorb. 430. 1858.

灌木或小乔木；小枝无毛。叶近革质，卵形，长13—20厘米，宽8—12厘米，顶端渐尖，基部近截平，浅的盾状着生，或微心形，具斑状腺体2个，下面无毛，具颗粒状腺体，叶缘具不规则的波状齿；叶柄长5—10厘米；托叶披针形，长8毫米，宽3毫米，无毛，早落。雄花序圆锥状，长10—15厘米，无毛；苞片三角状披针形，长6—8毫米，具盘状腺体5—7个，或匙形，长3—4毫米，具盘状腺体1个，苞腋具花多朵；雄花：萼片4枚；雄蕊5—7枚，花药4室。雌花序圆锥状，长10—14厘米；苞片匙形，具盘状腺体2个，苞腋具花1—3朵；雌花：花萼3—4裂，长约1毫米；子房2室，花柱2枚，长约1毫米，基部稍合生。蒴果双球形，具颗粒状腺体。花期5—6月。

产于台湾 (兰屿和火烧岛)。生于海滨密林中。菲律宾也有分布。模式标本采自台湾。

组3. 齿苞组 Sect. Sampsonianae Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (N. 147. VII): 317. 1914.

叶不分裂，盾状或非盾状着生，掌状脉；托叶多少呈披针形，长1—3厘米，脱落；苞片具齿，无盘状腺体；雄蕊2—4 (—5) 枚，花药4室；子房2室，平滑。蒴果无刺。

模式种：鼎湖血桐 *Macaranga sampsonii* Hance

本组约6种；我国产1种。