

5. 鼎湖血桐 (广西植物) 图版 12: 1—5

Macaranga sampsonii Hance in Journ. Bot. **9**: 134. 1871; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 443. 1894; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (IV. 147. VII): 318. 1914; H. S. Kiu in Guihaia **2**: 148. 1982, *in clavi*.

灌木或小乔木，高 2—7 米；嫩枝、叶和花序均被黄褐色绒毛，小枝无毛，有时被白霜。叶薄革质，三角状卵形或卵圆形，长 12—17 厘米，宽 11—15 厘米，顶端骤长渐尖，基部近截平或阔楔形，浅的盾状着生，有时具斑状腺体 2 个，下面具柔毛和颗粒状腺体，叶缘波状或具腺的粗锯齿；掌状脉 7—9 条，侧脉约 7 对；叶柄长 5—13 厘米，具疏柔毛或近无毛；托叶披针形，长 7—10 毫米，宽 2—3 毫米，具柔毛，早落。雄花序圆锥状，长 8—12 厘米；苞片卵状披针形，长 5—12 毫米，顶端尾状，边缘具 1—3 枚长齿、苞腋具花 5—6 朵；雄花：萼片 3 枚，长约 1 毫米，具微柔毛；雄蕊 4 (3—5) 枚，花药 4 室；花梗长 1 毫米。雌花序圆锥状，长 7—11 厘米；苞片形状如同雄花序的苞片，长 4—8 毫米；雌花：萼片 4 (—3) 枚，卵形，长 1.5 毫米，具短柔毛；子房 2 室，花柱 2 枚，长约 2 毫米。蒴果双球形，长 5 毫米，宽 8 毫米，具颗粒状腺体；果梗长 2—4 毫米。花期 5—6 月，果期 7—8 月。

产于福建西部和南部、广东、广西中部和南部。生于海拔 200—500 (—800) 米山地或山谷常绿阔叶林中。越南北部也有分布。模式标本采自广东高要 (鼎湖山)。

组 4. 腺苞组 Sect. Adenoceras (Reichb. f. et Zoll.) Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (IV. 147. VII): 334. 1914. —— *Mappa* Scet. *Adenoceras* Reichb. f. et Zoll. in Verh. Natuurk. Ver. Nederl. Ind. **1**: 9. 1856.

叶三角状卵形或卵圆形，盾状着生或非盾状着生，掌状脉；托叶长 7—10 毫米，凋落。苞片边缘通常具腺体；雄蕊 7—20 枚，花药 4 室；子房 2 室。蒴果无刺。


模式种：中平树 *Macaranga denticulata* (Bl.) Muell. Arg.

本组约 10 种，我国产 2 种。

6. 中平树 (中国树木分类学) 牢麻 (云南屏边)

Macaranga denticulata (Bl.) Muell. Arg. in DC. Prodr. **15** (2): 1000. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 446. 1887; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (IV. 147. VII): 334. 1914; Merr. in Lingnan Sci. Journ. **5**: 111. 1927; 海南植物志 **2**: 160. 1965; Airy Shaw in Kew Bull. **26**: 288. 1972; 中国高等植物图鉴 **2**: 604, 图 2937. 1972. —— *Mappa denticulata* Bl. Bijdr. 625. 1825. —— *Macaranga henricorum* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 442. 1894.

乔木，高 3—10 (—15) 米；嫩枝、叶、花序和花均被锈色或黄褐色绒毛；小枝粗壮，具纵棱，绒毛呈粉状脱落。叶纸质或近革质，三角状卵形或卵圆形，长 12—30 厘米，宽 11—28 厘米，盾状着生，顶端长渐尖，基部钝圆或近截平，稀浅心形，两侧通常各具斑



图版 12 1—5. 黑湖血桐 *Macaranga sampsonii* Hance: 1. 雌花枝; 2—3. 苞片; 4. 雄花; 5. 果。
6—9. 盾叶木 *M. adenantha* Gagnep.: 6. 雄花枝; 7. 一段雄花序; 8. 雄花; 9. 雌花。

(邓盈丰绘)