

缅甸南部、马来西亚、泰国等国。模式标本采自印度安达曼群岛。

依记载描述；未见采自云南的标本。

26. 假蓼包叶属 *Discocleidion* (Muell. Arg.) Pax et Hoffm.

Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (N. 147. VII): 45. 1914. —
Cleidion Sect. *Discocleidion* Muell. Arg. in Flora **47**: 481. 1864. et in
 DC. Prodr. **15** (2): 984. 1866.

灌木或小乔木。叶互生，边缘有锯齿，基出脉3—5条；具小托叶2枚。总状花序或圆锥花序，顶生或腋生；花雌雄异株，无花瓣，雄花3—5朵簇生于苞腋，花蕾球形，花萼裂片3—5，镊合状排列；雄蕊25—60枚，花丝离生，花药4室，成对地一端附着成水平状相对生，内向，纵裂，药隔不突出；花盘具腺体，腺体靠近雄蕊，小、呈棒状圆锥形；无不育雌蕊；雌花1—2朵生于苞腋；花萼裂片5；花盘环状，具小圆齿；子房3室，每室有胚珠1颗，花柱3，2裂至中部或几达基部。蒴果具3个分果片；种子球形，稍具疣状突起。

模式种：大假蓼包叶 *Discocleidion ulmifolium* (Muell. Arg.) Pax et Hoffm.

3种；分布于我国和日本（琉球群岛）。我国产2种。

分种检索表

1. 小枝、叶和花序均密被白色或淡黄色长柔毛；果被毛
 1. 假蓼包叶 *D. rufescens* (Franch.) Pax et Hoffm.

1. 植株除嫩芽外均无毛；果无毛 2. 光假蓼包叶 *D. glabrum* Merr.

1. 假蓼包叶（种子植物名称） 艾桐（陕西），老虎麻（湖北） 图版15: 1—4

Discocleidion rufescens (Franch.) Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (N. 147. VII): 45. 1914; Lév. Fl. Kouy-Tchéou 161. 1914, *pro parte*; Rehd. in Journ. Arn. Arb. **14**: 234. 1933; 中国高等植物图鉴 **2**: 597, 图2924. 1972; 秦岭植物志 **1** (3): 177, 图152. 1981; Lauener in Not. Roy Bot. Gard. Edinb. **40**: 478. 1983. — *Alchornea rufescens* Franch. in Nouv. Arch. Mus. 2. ser. VII. 75, t. 7. 1884; Diels in Engl. Bot. Jahrb. **29**: 429. 1900. — *Mallotus cavaleriei* Lév. in Fedde, Rep. Sp. Nov. **11**: 296. 1912.

灌木或小乔木，高1.5—5米；小枝、叶柄、花序均密被白色或淡黄色长柔毛。叶纸质，卵形或卵状椭圆形，长7—14厘米，宽5—12厘米，顶端渐尖，基部圆形或近截平，稀浅心形或阔楔形，边缘具锯齿，上面被糙伏毛，下面被绒毛，叶脉上被白色长柔毛；基出脉3—5条，侧脉4—6对；近基部两侧常具褐色斑状腺体2—4个；叶柄长3—8厘米，