

7: 215. 1931.

本变种的叶下面灰绿色，被柔毛，小托叶长 2—5 毫米。雄花序密生短柔毛，苞片长 1—1.5 毫米，基部通常具 1 个腺体；雌花具萼片 6—8 枚，长 2.5—3 毫米，无腺体，子房被淡黄色绒毛，花柱长 7—9 毫米，基部合生部分长 1.5—2 毫米。花期 3—5 月，果期 6—9 月。

产于四川（古蔺）、贵州南部、广西西北部至西南部、云南东南部。生于海拔 500—1 200 米石灰岩山地疏林中。模式标本采自贵州安龙。

4. 厚柱山麻杆（新拟） 台湾山麻杆（台湾植物志）

Alchornea kelungensis Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 102. 1920. — *A. trewioides* (Benth.) Muell. Arg. var. *formosae* (Muell. Arg.) Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 63 (N. 147. VII): 248. 1914; H. Keng in Journ. Wash. Acad. Sci. 41: 204. 1951; C. F. Hsieh in Fl. Taiwan 3: 443, Pl. 679. 1977. — *A. formosae* Muell. Arg. ex Pax et Hoffm. 1. c., pro. syn. sub. *Alchornea trewioides*. — *A. liukiensis* Hayata var. *formosae* (Muell. Arg.) Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. III, Bot. 6: 303. 1954.

灌木；小枝被灰黄色短毛，后变无毛。叶薄纸质，卵形或卵状三角形，长 9—12 厘米，宽 6—11 厘米，顶端短渐尖，基部阔楔形或浅心形，边缘具疏生腺齿，上面无毛，下面沿中脉具疏毛，基部具斑状腺体 4 个；基出脉 3 条；小托叶钻状，长约 2 毫米；叶柄长 3—7 厘米，具疏毛；托叶披针形，长 3—6 毫米，具疏毛，早落。雌雄同株，通常雌雄花同序，花序顶生或腋生，穗状，长 7—10 厘米，具疏毛，苞片卵状三角形，长 3—4 毫米，小苞片三角形，长 1.5—2 毫米，雄花 9—11 朵簇生于苞腋，雌花生于花序的下部；雄花：萼片 3—4 枚，长约 2.5 毫米，无毛；雄蕊 8 枚；花梗长 1—2 毫米；雌花：萼片 5 枚，卵状三角形，不等大，长 2.5—3.5 毫米，宽 1.5—2 毫米，顶端渐尖或急尖，疏生柔毛；子房具贴生短毛，花柱 3 枚，粗厚，披针状，长 4—5 毫米，基部合生部分长约 1 毫米。蒴果近球形，直径约 1 厘米，具 3 浅沟，被微毛；种子扁卵状，长约 7 毫米，种皮具小瘤。花期 3—4 月，果期 6—7 月。

产于台湾（台北、基隆）。生于低海拔山地灌丛中。模式标本采自基隆。

5. 毛果山麻杆 新拟

Alchornea mollis (Benth.) Muell. Arg. in Linnaea 34: 168. 1865, et in DC. Prodr. 15 (2): 902. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 420. 1887; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 63 (N. 147. VI): 248. 1914. — *Stipellaria mollis* Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. 6: 3. 1854.

灌木或小乔木，高 3—5 米；小枝被灰白色微柔毛。叶膜质，阔卵形，长 9—20 厘米，宽 8—20 厘米，顶端渐尖或尾状渐尖，基部近截平状心形，边缘具疏生小腺齿，上面无毛，下面被微柔毛，基部具斑状腺体 4 个；基出脉 3 条；小托叶线状，长约 3 毫米，具