

疏毛；叶柄长 8—10 厘米，被微柔毛；托叶披针形，长 5—6 毫米，疏生柔毛。雌雄异株，雄花序穗状，长 2—8 厘米，1—3 个生于小枝已落叶腋部，各部均密生短柔毛，花序梗短，苞片长三角形，长 1—2 毫米，雄花 9—11 朵簇生于苞腋，花梗长 1.5 毫米，近顶部具关节；雌花序总状，顶生，长 6—8 厘米，各部均密生微柔毛，苞片披针形，长 3—5 毫米，小苞片长约 2 毫米；雄花：花萼花蕾时球形，直径 1.5 毫米，近无毛，萼片 3 枚；雄蕊 8 枚；雌花：萼片 5—6 枚，披针形，长 2.5—3 毫米，具柔毛，其中 1 枚基部具腺体；子房球形，被短绒毛，花柱 3 枚，线状，长 6—8 毫米，合生部分长约 1 毫米；花梗长 2 毫米。蒴果近球形，直径约 1 厘米，果皮平坦，被短绒毛；种子扁卵状，长约 7 毫米，种皮具粗皱纹。花期 4—8 月。

产于云南（碧江）、四川（泸定）。生于海拔 1 200—1 950 米河谷坡地或溪畔林下。印度东北部、锡金、不丹和尼泊尔也有分布。模式标本采自尼泊尔。

6. 湖南山麻杆（植物分类学报）

Alchornea hunanensis H. S. Kiu in Acta Phytotax. Sin. **26**: 458, f. 1. 1988.

灌木，高约 2 米；小枝被柔毛。叶膜质或薄纸质，卵圆形，长 10—12 厘米，宽 8—10 厘米，顶端渐尖，基部浅心形或近截平，边缘具腺齿，上面沿脉被柔毛，下面被柔毛，基部具斑状腺体 4 个；基出脉 3 条；小托叶钻状，长 2—5 毫米，具毛；叶柄长 5—8 厘米，被毛；托叶披针形，长 6—8 毫米，疏生柔毛。雌雄异株，雄花序穗状，腋生，长 9—15 厘米，疏生柔毛，苞片阔卵形，长约 2 毫米；雄花 5—7 朵簇生于苞腋，花梗长 1.5—2 毫米，无毛，下半部具关节；雌花序总状，顶生，长 3—4 厘米，具花 4—7 朵，各部均被柔毛，苞片长三角形，长 4—4.5 毫米，小苞片线形，长 3 毫米；雄花：花萼花蕾时球形，直径约 2 毫米，无毛，萼片 3 枚；雄蕊 6—8 枚；雌花：萼片 5 枚，披针形，长 2—2.5 毫米，具柔毛；子房球形，密生灰黄色长柔毛，花柱 3 枚，线状，长 10—15 毫米，合生部分长 1.5—3 毫米。蒴果近球形，具 3 浅沟，直径约 1 厘米，果皮密生长柔毛和散生小疣；果梗长 1—1.5 毫米，具疏柔毛；种子扁卵状，长 8 毫米，种皮淡褐色，具小瘤。

花期 4—5 月，果期 6—7 月。

产于湖南西部、广西（全县）。生于海拔 350—900 米石灰岩山坡或山谷疏林下或灌丛中。模式标本采自湖南黔阳。

7. 椴叶山麻杆（新拟） 野生麻（云南河口） 图版 16: 6

Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. in Linnaea **34**: 168. 1865, et in DC. Prodr. **15** (2): 903. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **5**: 421. 1887; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (N. 147. VI): 250. 1914; Chun in Sunyatsenia **4**: 205. 1940, pro parte; Airy Shaw in Kew Bull. **26**: 212. 1972. — *Stipellaria tiliifolia* Benth. in Journ. Bot. Kew Misc. **6**: 4. 1854.

灌木或小乔木，高 2—8 米；小枝密生柔毛。叶薄纸质，卵状菱形、卵圆形或长卵形，长 10—17 厘米，宽 5.5—16 厘米，顶端渐尖或尾状，基部楔形或近截平，边缘具腺齿，