

Soc. New Ser. **24** (2): 236. 1935; 海南植物志 **2**: 151. 1965. — *Mercurialis indica* Lour. Fl. Cochinch. 628. 1790. *non* L. — *Baliospermum* sp.? Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 444. 1894.

灌木或小乔木，高1—5米；嫩枝被疏毛。叶膜质，干后浅紫色，长圆状披针形或披针形，长9—16厘米，顶端渐尖，基部楔形或阔楔形，无毛，边缘具钝腺齿或锯齿；叶柄长1.5—5厘米，顶部具2枚小腺体；托叶钻状，长4—5毫米。雌雄异株，雄花序长11—13厘米，苞片卵状三角形，长1—1.5毫米，雄花2—3朵簇生于苞腋；雌花序长4—5厘米，苞片三角形，长1毫米，雌花1朵，生于苞腋；雄花：花萼裂片3枚，长约2毫米，无毛；雄蕊40—50枚，花丝长1.5毫米；靠近雄蕊的腺体，棒状，长约0.5毫米，顶端具数条柔毛；花梗长3—4毫米；雌花：萼片3枚，近三角形，长约1毫米；腺体3枚，卵形；子房近球形，无毛，花柱3枚，长约1.5毫米，基部合生，具羽毛状突起；花梗长3毫米。蒴果具3个分果片，直径9毫米，果皮纸质；种子近球形，直径约4.5毫米。 花果期2—11月。

产于广东（徐闻）、海南。生于海拔60—700米平原或山地灌木林或热带季雨林中。越南也有分布。模式标本采自海南。

2. 台湾白桐树（新拟） 假铁苋（台湾植物志）

Claoxylon brachyandrum Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **63** (N. 147. VI): 115. 1914; H. Keng in Taiwania **6**: 39. 1955; Airy Shaw in Kew Bull. Add. Ser. IV: 70. 1975; C. F. Hsieh in Fl. Taiwan **3**: 454, pl. 684. 1977. — *C. kotoense* Hayata, Ic. Pl. Form. **9**: 101. 1920; Kanehira, Formos. Trees Rev. 334, f. 289. 1936. — *C. rubescens* auct. *non* Miq.; Hayata, Gen. Ind. Fl. Form. 65. 1916.

灌木或小乔木，高4—5米；嫩枝被疏柔毛。叶厚纸质，干后淡紫色，长圆形或长圆状披针形，长15—20厘米，宽5—8厘米，顶端短渐尖，基部楔形，无毛，边缘具粗圆锯齿；叶柄长3.5—6厘米，顶端具2枚小腺体。雌雄异株，雄花序长6—7厘米，苞片卵形，小，雄花1—3朵生于苞腋，花梗长3毫米；雌花序长1.5—3厘米，苞片卵形，小，雌花1（—2）朵生于苞腋；雄花：花萼裂片3（—4）枚，长约2.5毫米；雄蕊约30枚，花丝长1—2毫米；靠近雄蕊的腺体，鳞片状，长约0.5毫米，顶端具柔毛；雌花：萼片3枚，近三角形，长约1毫米；腺体3枚，肾形；子房无毛，花柱3枚，长2毫米，下半部合生，具乳头状突起；花梗长1—2毫米。蒴果具3个分果片；直径7毫米；种子近球形，直径3毫米。 花果期4—12月。

产于台湾（恒春半岛和兰屿岛）。生于低海拔灌木丛中。分布于菲律宾、马来西亚（沙巴）。模式标本采自菲律宾吕宋。

3. 白桐树（广州植物志） 咸鱼头（海南），丢了棒（生草药性备要） 图版18: 1—

Claoxylon indicum (Reinw. ex Bl.) Hassk. Cat. Pl. Hort. Bogor. Alter. 235.