

形，长4—13厘米，宽2.5—7厘米，顶端渐尖，基部圆钝或阔楔形，两面沿叶脉被柔毛，叶缘具粗锯齿；基出脉3条，叶柄长1—6厘米，被长柔毛；托叶披针形，长2—4毫米，具毛。雌雄同株，雌雄花同序或异序，花序腋生，长4—5（—11）厘米，花序梗短或几无，花序轴纤细，具疏毛，雌花苞片1—5枚，散生于花序下部，雄花生于花序上部，有时花序全部为雄花或仅具1—2朵雌花；雌花苞片近心形，花后稍增大，长约2毫米，宽3毫米，具浅齿4—5枚，外面疏生柔毛，苞腋具雌花1朵，花梗几无；雄花苞片卵形，散生，长约0.5毫米，具毛，苞腋具雄花多朵，排成团伞花序，雄花：花蕾时近球形，花萼裂片4枚，长约1毫米；雄蕊8枚，花梗长约1毫米，具疏毛；雌花：萼片4（—3）枚，近三角形，长约1毫米，具疏毛；子房被毛和具散生短刺，花柱3枚，长2—2.5毫米，撕裂约11条。蒴果直径2.5—3毫米，具3个分果片，果皮具疏毛和数枚具毛的短软刺，种子卵圆形，长约2毫米。花期3—8月。

产于广西西南部、云南（金平、勐海）。生于海拔250—500米石灰岩地区常绿林下或灌丛中。缅甸、泰国、越南北部也有分布。模式标本采自泰国清迈。

11/ 菱叶铁苋菜（新拟）

Acalypha siamensis Oliv. ex Gage in Rec. Bot. Surv. Ind. 9, 238 1922, Ridley, Fl. Malay Penins. 3, 274 1924, Merr. in Journ. Arn. Arb. 19, 39 1938; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 207. 1972. — *A. evrardii* Gagnep. in Bull. Soc. Bot. France 70: 871 1923, et in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 5, 336 1925.

灌木，高1—2米；嫩枝被短柔毛，小枝红褐色，无毛。叶纸质，互生或短枝上近簇生，菱形或卵状菱形，长（2—）2.5—6厘米，宽（1—）2—3厘米，顶端钝尖，基部楔形，边缘具锯齿，两面均无毛，羽状脉，叶柄短，长2—4（—8）毫米，具短毛，托叶三角形，硬纸质，长1.5—3毫米，渐尖或急尖。雌雄同株，通常雌雄花同序，花序腋生，长1.5—5厘米，花序梗短或几无，花序轴具短柔毛，雄花生于花序上部，雌花2—3朵生于花序基部或无雌花；雌花苞片圆肾形，长约6毫米，具齿约11枚，无毛，苞腋具雌花1朵，花梗无，雄花苞片卵形，长0.5—1毫米，具毛，苞腋具雄花5—9朵，排成团伞花序；雄花：花蕾近扁球形，直径约0.5毫米，花萼裂片4枚，雄蕊8枚；花梗长约0.5毫米，雌花：萼片3枚，卵形，长约1毫米，子房密生具毛的长软刺，花柱3枚，长2—3毫米，撕裂。蒴果具3个分果片，具软刺，种子卵球形，长约2.5毫米。花期7—8月。

产于福建厦门（栽培）、海南西部。生于低海拔河谷干燥疏林下。泰国、马来西亚、柬埔寨、老挝、越南也有分布。模式标本采自泰国。

组6 全缘苞组 Sect. *Caturoideae* Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 85 (IV. 147 (VI)). 139. 1924.

灌木；雌雄异株，花序腋生；雌花序穗状，细长且下垂，苞片小，长约1毫米，全

缘, 花后不增大; 叶具掌状脉或基出脉。

模式种: 尖尾铁苋菜 *Acalypha caturus* Bl.

本组约 5 种, 我国产 3 种。

12. 红穗铁苋菜 (新拟) 狗尾红 (广州植物志)

Acalypha hispida Burm. f. Fl. Ind. 303. t. 61, f. 1. 1768; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 815. 1866; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 85 (N. 147. VI): 140. 1924; 广州植物志 277. 1956; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 206. 1972.

灌木, 高 0.5—3 米; 嫩枝被灰色短绒毛, 毛逐渐脱落, 小枝无毛。叶纸质, 阔卵形或卵形, 长 8—20 厘米, 宽 5—14 厘米, 顶端渐尖或急尖, 基部阔楔形、圆钝或微心形, 上面近无毛, 下面沿中脉和侧脉具疏毛, 边缘具粗锯齿; 基出脉 3—5 条; 叶柄长 4—8 厘米, 具短柔毛; 托叶狭三角形, 长 0.6—1 厘米, 具疏柔毛。雌雄异株, 雌花序腋生, 穗状, 长 15—30 厘米, 下垂, 花序轴被柔毛; 雌花苞片卵状菱形, 散生, 长约 1 毫米, 全缘, 外面具柔毛, 苞腋具雌花 3—7 朵, 簇生; 雌花: 萼片 4 (—3) 枚, 近卵形, 长约 0.8 毫米, 顶端急尖, 具短毛; 子房近球形, 密生灰黄色粗毛, 花柱 3 枚, 长 6—7 毫米, 撕裂 5—7 条, 红色或紫红色; 雄花序未见。蒴果未见。 花期 2—11 月。

原产于太平洋岛屿, 可能在俾斯麦群岛; 现热带、亚热带地区广泛栽培为庭园观赏植物; 我国台湾、福建、广东、海南、广西、云南南部的公园或庭园常有栽培, 以其绿叶和红花序供观赏。采用扦插繁殖, 多为盆栽。

13. 尖尾铁苋菜 (新拟) 尖尾铁苋、兰屿铁苋 (台湾植物志)

Acalypha caturus Bl. Bijdr. 629. 1825; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 805. 1866; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 85 (N. 147. VI): 141. 1924; H. Keng in Taiwan 6: 31. 1955; Airy Shaw in Kew Bull. Add. Ser. IV. 23. 1975; C. F. Hsieh in Fl. Taiwan 3: 441. 1977. — *A. kotoensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 99. 1920. — *A. longi-acuminata* Hayata, op. cit. 100. 1920, “longe-acuminata”, syn. nov.; H. Keng. l. c.; C. F. Hsieh op. cit. 442. 1977. — *A. grandis* Benth. var. *kotoensis* (Hayata) Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. III. Bot. 6: 300. 1954. — *A. grandis* Benth. var. *longi-acuminata* (Hayata) Hurusawa l. c..

大灌木; 嫩枝被灰白色短绒毛。叶纸质, 阔卵形或卵形, 长 8—15 (—20) 厘米, 宽 5.5—12 厘米, 顶端渐尖或长渐尖, 基部圆钝或截平, 有时稍心形, 边缘具浅圆齿, 下面沿叶脉具短绒毛, 在二级脉腋部具一簇髯毛; 基出脉 3—5 条; 叶柄长 5—10 厘米, 被短毛; 托叶线状披针形, 长 4—12 毫米, 具疏柔毛。雌雄异株, 稀同株, 花序腋生, 雄花序长 10—20 厘米, 花序轴被短柔毛, 苞片疏生, 卵形, 长约 0.5 毫米, 具毛, 苞腋具雄花多朵, 排成团伞花序; 雌花序穗状, 长 10—30 厘米, 雌花苞片疏生, 卵形, 长约 1 毫米, 顶端急尖, 具毛, 苞腋具雌花 1 朵; 雄花: 花萼裂片 4 枚, 长约 0.3 毫米; 雄蕊 8 枚; 花梗长约 1 毫米; 雌花: 萼片 3 枚, 卵形, 长约 1 毫米, 具毛; 子房被柔毛, 通常 2 室,