

缘, 花后不增大; 叶具掌状脉或基出脉。

模式种: 尖尾铁苋菜 *Acalypha caturus* Bl.

本组约 5 种, 我国产 3 种。

12. 红穗铁苋菜 (新拟) 狗尾红 (广州植物志)

Acalypha hispida Burm. f. Fl. Ind. 303. t. 61, f. 1. 1768; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 815. 1866; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 85 (W. 147. VI): 140. 1924; 广州植物志 277. 1956; Airy Shaw in Kew Bull. 26: 206. 1972.

灌木, 高 0.5—3 米; 嫩枝被灰色短绒毛, 毛逐渐脱落, 小枝无毛。叶纸质, 阔卵形或卵形, 长 8—20 厘米, 宽 5—14 厘米, 顶端渐尖或急尖, 基部阔楔形、圆钝或微心形, 上面近无毛, 下面沿中脉和侧脉具疏毛, 边缘具粗锯齿; 基出脉 3—5 条; 叶柄长 4—8 厘米, 具短柔毛; 托叶狭三角形, 长 0.6—1 厘米, 具疏柔毛。雌雄异株, 雌花序腋生, 穗状, 长 15—30 厘米, 下垂, 花序轴被柔毛; 雌花苞片卵状菱形, 散生, 长约 1 毫米, 全缘, 外面具柔毛, 苞腋具雌花 3—7 朵, 簇生; 雌花: 萼片 4 (—3) 枚, 近卵形, 长约 0.8 毫米, 顶端急尖, 具短毛; 子房近球形, 密生灰黄色粗毛, 花柱 3 枚, 长 6—7 毫米, 撕裂 5—7 条, 红色或紫红色; 雄花序未见。蒴果未见。 花期 2—11 月。

原产于太平洋岛屿, 可能在俾斯麦群岛; 现热带、亚热带地区广泛栽培为庭园观赏植物; 我国台湾、福建、广东、海南、广西、云南南部的公园或庭园常有栽培, 以其绿叶和红花序供观赏。采用扦插繁殖, 多为盆栽。

13. 尖尾铁苋菜 (新拟) 尖尾铁苋、兰屿铁苋 (台湾植物志)

Acalypha caturus Bl. Bijdr. 629. 1825; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 805. 1866; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. 85 (W. 147. VI): 141. 1924; H. Keng in Taiwan 6: 31. 1955; Airy Shaw in Kew Bull. Add. Ser. IV. 23. 1975; C. F. Hsieh in Fl. Taiwan 3: 441. 1977. — *A. kotoensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 99. 1920. — *A. longi-acuminata* Hayata, op. cit. 100. 1920, “longe-acuminata”, syn. nov.; H. Keng. l. c.; C. F. Hsieh op. cit. 442. 1977. — *A. grandis* Benth. var. *kotoensis* (Hayata) Hurusawa in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. III. Bot. 6: 300. 1954. — *A. grandis* Benth. var. *longi-acuminata* (Hayata) Hurusawa l. c..

大灌木; 嫩枝被灰白色短绒毛。叶纸质, 阔卵形或卵形, 长 8—15 (—20) 厘米, 宽 5.5—12 厘米, 顶端渐尖或长渐尖, 基部圆钝或截平, 有时稍心形, 边缘具浅圆齿, 下面沿叶脉具短绒毛, 在二级脉腋部具一簇髯毛; 基出脉 3—5 条; 叶柄长 5—10 厘米, 被短毛; 托叶线状披针形, 长 4—12 毫米, 具疏柔毛。雌雄异株, 稀同株, 花序腋生, 雄花序长 10—20 厘米, 花序轴被短柔毛, 苞片疏生, 卵形, 长约 0.5 毫米, 具毛, 苞腋具雄花多朵, 排成团伞花序; 雌花序穗状, 长 10—30 厘米, 雌花苞片疏生, 卵形, 长约 1 毫米, 顶端急尖, 具毛, 苞腋具雌花 1 朵; 雄花: 花萼裂片 4 枚, 长约 0.3 毫米; 雄蕊 8 枚; 花梗长约 1 毫米; 雌花: 萼片 3 枚, 卵形, 长约 1 毫米, 具毛; 子房被柔毛, 通常 2 室,