

无毛；托叶分裂呈刺状，宿存。花序顶生，具长总梗，分枝短，红色，花萼长约2毫米，裂片近圆形，长约1毫米；花瓣倒卵状长圆形，长约6毫米，红色；雄花：雄蕊6—8枚，基部合生，花药与花丝近等长；雌花：子房无毛，花柱3枚，基部合生，顶端2裂。蒴果椭圆状，长13—18毫米，直径约15毫米，具3纵沟；种子长约1.1厘米，平滑。花期几全年。

原产中美洲或南美洲热带地区；现作为观赏植物栽培。我国许多省区园林部门及花卉爱好亦有栽培。

3. 珊瑚花 (广州植物志)

Jatropha multifida L. Sp. Pl. 1006, 1753; Muell. Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 1089. 1866; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 383. 1887; Pax in Engl. Pflanzenr. 42 (N. 147. 1): 40. 1910; Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine 5: 325. 1925; 广州植物志 272, 1956, indic. in nota.

灌木或小乔木，高2—3（—6）米；茎枝具乳汁，无毛。叶轮廓近圆形，宽10—30厘米，掌状9—11深裂，裂片线状披针形，长8—18厘米，宽1—5厘米，全缘、浅裂至羽状深裂，上面绿色，下面灰绿色，两面无毛；掌状脉9—11条，各自延伸至掌状裂片顶端，裂片的羽状脉纤细；叶柄长10—25厘米；托叶细裂成分叉的刚毛状，长达2厘米。花序顶生，总梗长13—20厘米，花梗短，花密集；雄花：花萼长2—3毫米，裂片5枚，近圆形，无毛；花瓣5枚，匙形，红色，长约4毫米；雄蕊8枚，花丝仅基部合生，花药伸长；雌花：花萼如雄花；花瓣长6—7毫米，红色；子房无毛，花柱3枚，下半部合生。蒴果椭圆状至倒卵状，长约3厘米，无毛。花期7—12月。

原产美洲热带和亚热带地区；现栽培作观赏植物。我国南部各省区的园林有栽培。

49. 变叶木属 *Codiaeum* A. Juss. (1824), nom.

conserv. = *Phyllaurea* Lour. (1790)

A. Juss. Euphorb. Gen. Tent. 33. 1824.

灌木或小乔木。叶互生，全缘，稀分裂；具叶柄；托叶小或缺。花雌雄同株，稀异株，花序总状；雄花：数朵簇生于苞腋，花萼（3—）5（—6）裂，裂片覆瓦状排列；花瓣细小，5—6枚，稀缺；花盘分裂为5—15个离生腺体；雄蕊15—100枚；无不育雌蕊；雌花：单生于苞腋，花萼5裂；无花瓣；花盘近全缘或分裂；子房3室，每室有1颗胚珠，花柱3枚，不分裂，稀2裂。蒴果；种子具种阜，子叶阔，扁平。

模式种：变叶木 *Codiaeum variegatum* (L.) A. Juss.

约15种，分布于亚洲东南部至大洋洲北部。我国栽培1种。

1. 变叶木 (种子植物名称) 洒金榕 (广州) 图版 36: 1—4

Codiaeum variegatum (L.) A. Juss. Euphorb. Gen. Tent. 80, 111., 1824; Airy