

2. 子房密被绢质长柔毛；叶长圆形至椭圆状长圆形，长2—10厘米，宽1—3.5厘米；叶柄长5—10毫米 2. 龙州留萼木 *B. longzhouensis* X. X. Chen
2. 子房被疏长柔毛；叶倒卵状椭圆形，长2—4.5厘米，宽1.5—2.5厘米；叶柄长2—6毫米 3. 海南留萼木 *B. chunii* Y. T. Chang et P. T. Li
1. 留萼木 (中国高等植物图鉴) 图版 37: 1—9

Blachia pentzii (Muell. Arg.) Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot. **17**: 226, 1878; Pax et Hoffm. in Engl. Pflanzenr. **47** (W. 147. III): 38, 1911; Gagnep. in Lec. Fl. Gén. Indo-Chine **5**: 412, 1926; 海南植物志 **2**: 171, 图 386, 1965; 中国高等植物图鉴 **2**: 610, 图 2949, 1972. ——*Codiaeum pentzii* Muell. Arg. in DC. Prodr. **15** (2): 1118, 1866.

灌木，高1—4米；枝条常灰白色，密生褐色突起皮孔，无毛。叶纸质或近膜质，形状、大小变异很大，卵状披针形、倒卵形、长圆形至长圆状披针形，长(4—)5—10(—18)厘米，宽(1—)2—3.5(—6)厘米，顶端短尖至长渐尖，基部渐狭、阔楔形或钝，全缘，两面无毛；侧脉6—12对；叶柄长0.5—2(—3)厘米。花序顶生或腋生，雌花序常呈伞形花序状，总花梗长1—2厘米；雄花序总状，总花梗长2—8厘米；雄花：花梗细长，长8—12毫米；萼片近圆形，长约2毫米；花瓣宽倒卵形，顶端截平或微凹，长约1毫米，黄色；腺体宽且扁；雄蕊约15枚；雌花：花梗长5—10毫米，花后伸长，棒状增粗；萼片卵形至卵状披针形，长2—3毫米，花后稍增大；腺体4—5枚；子房球形，无毛，花柱3枚，2深裂，线状。蒴果近球形，顶端稍压扁，直径约1.5厘米，无毛；种子卵状至椭圆状，有斑纹。花期几全年。

产于广东南部和海南。生于山谷、河边的林下或灌木丛中。越南也有分布。模式标本采自海南。

2. 龙州留萼木 (植物分类学报)

Blachia longzhouensis X. X. Chen in Acta Phytotax. Sin. **26**: 76, f. 1. 1988.

灌木，高达1米；小枝灰色，具明显皮孔。叶纸质，长圆形至椭圆状披针形，长2—10厘米，宽1—3.5厘米，顶端短尖至渐尖，基部近圆形至阔楔形，全缘，两面无毛；侧脉4—7对；叶柄长5—10毫米，被白色柔毛。花雌雄同株，雄花序顶生，总状，有花5—10朵，花序梗长1—1.5厘米，被白色绢质柔毛，雌花序伞形花序状，有花2—4朵，生于雄花序基部或小枝顶端，花序梗短；雄花：花梗长3—5毫米；萼片5枚，卵形，长约3毫米，绿色，无毛；花瓣5枚，膜质，阔倒卵形，长约1.2毫米，宽约1.6毫米；花盘5裂；雄蕊约24枚，无毛；雌花：花梗棒状，长约4毫米，被柔毛；萼片5枚，披针形，长2.5—3毫米，外面被柔毛，内面无毛；花盘环状，5—6裂；子房密被白色绢质长柔毛，花柱3枚，仅基部合生，上部2深裂，线形。蒴果扁球状，具3纵沟，直径约1.2厘米，被柔毛；种子椭圆状，长约7毫米，种皮脆壳质，有斑纹。花期9—10月。

产于广西(龙州)。生于石灰岩山上的灌木丛中。模式标本采自龙州。



图版 37 1—9. 留萼木 *Blachia pentzii* (Mueell. Arg.) Benth.: 1. 花枝; 2. 叶; 3. 雌花; 4. 雌蕊纵切面; 5. 雄花; 6. 雄蕊; 7. 雌花萼片; 8. 雄花萼片; 9. 雄花花瓣。(邓品发绘)