

约 1.2 毫米，直径约 0.8 毫米，每个棱面具数个皱纹，无种阜。 花果期 8—12 月。

产于长江以南的江西、台湾、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州和云南；近年在我国北京发现逸为野生的现象。生于旷野荒地，路旁，灌丛及田间。广布于世界热带和亚热带。模式标本采自东印度。

全草入药，通奶，故名。

7. 细齿大戟 (海南植物志) 华南大戟 (台湾植物志) 图版 8: 1—4

*Euphorbia bifida* Hook. & Arn. Bot. Cap. Beechey Voy. 5: 213. 1837; Boiss. in DC. Prodr. 15 (2): 25. 1862; Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 412. 1894; Lév. in Bull. Herb. Boiss. 2, 6: 761. 1906; Dunn & Tutcher in Kew Bull. Misc. Inform., add. Ser. 10: 232. 1912; J. S. Ma & C. Y. Wu in Collect. Bot. 21: 104. 1992; et in Acta Bot. Yunnan. 15 (2): 117. 1993. — *E. serrulata* Reinw. ex Blume, Bijdr. 635. 1826; Boiss. in DC. Prodr. 15 (2): 25. 1862; Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 417. 1894; Lév. in Bull. Herb. Boiss. 2, 6: 764. 1906; Dunn & Tutcher in Kew Bull. Misc. Inform., add. Ser. 10: 232. 1912; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 5: 249. 1925; 海南植物志 2: 186. 1965; non Thuill. 1790 nec Vell. 1825. — *E. vachellii* Hook. & Arn. Bot. Cap. Beechey Voy. 5: 213. 1837; H. Keng in Taiwan. 6: 45. 1955; in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. 3, Bot. 6 (6): 283. 1954; 台湾植物志 3: 467. 1977; — *Chamaesyce vachellii* (Hook. & Arn.) Hurusawa Ohwi, Fl. Jap. 839. 1978; Lin et al. in Bot. Bull. Acad. Sin. 32: 235. f. 12. 1991; et in Fl. Taiw. ed 2, 3: 451, pl. 236, 1993.

一年生草本。根细，长 10—18 厘米，直径 3—5 毫米。茎基部木质化，向上多分枝，每个分枝再作二歧分枝，高 20—40 (50) 厘米，直径 3—5 毫米；茎节环状，明显。叶对生，长椭圆形至宽线形，长 1—2.5 厘米，宽 2—5 毫米，先端钝尖或渐尖，基部不对称，近平截或稍偏斜；边缘具细锯齿，齿尖有短尖；主脉于叶背隆起，于叶面下凹，侧脉羽状，清晰；叶柄短，长不足 3 毫米；托叶膜质，钻状三角形，易脱落。花序常聚生，偶单生；总苞杯状，高与直径各约 1 毫米；边缘 5 裂，裂片三角形，先端撕裂；腺体 4 枚；附属物粉红色，较腺体宽。雄花数枚，略伸出总苞外；雌花 1 枚，略伸出总苞外；子房光滑无毛；花柱 3，分离；柱头 2 裂。蒴果三棱状，直径与长均约 2 毫米，近无毛。种子三棱圆柱状，长约 1.5 毫米，直径约 1 毫米，褐色，被稀疏的横纹，无种阜。 花果期 4—10 月。

产于江苏、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、海南、贵州和云南。生于山坡、灌丛、路旁及林缘。分布于南亚半岛、印度尼西亚群岛直至澳大利亚。模式标本采自广东。

8. 飞扬草 (海南植物志) 乳籽草 (台湾植物志)，飞相草 (四川) 图版 8: 5—8



图版 8 1—4. 细齿大戟 *E. bifida* Hook. & Arn. : 1. 植株, 2. 花序; 3. 种子, 4. 叶 (放大)。5—8. 飞扬草 *E. hirta* Linn. : 5. 植株, 6. 花序, 7. 叶放大, 8. 种子。(何冬泉绘)